

SPISY
VYDÁVANÉ
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU
MASARYKOVY UNIVERSITY
REDAKTOR

PUBLICATIONS
DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK
RÉDIGÉES PAR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

Rok 1925

Čís. 52

ITER TURCICO-PERSICUM


PARS II

PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO

(COMPOSITAE)

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK



VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ČESKÁ 28

S P I S Y
VYDÁVANÉ
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU
MASARYKOVY UNIVERSITY
REDAKTOR

PUBLICATIONS
DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK
RÉDIGÉES PAR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

Rok 1925

Čís. 52

ITER TURCICO-PERSICUM

PARS II

PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO (COMPOSITAE)

SCRIPSIT

Dr. FR. NÁBĚLEK

VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ČESKÁ 28

ITER TURCICO-PERSICUM.
PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO.
(COMPOSITAE.)

PARS II.

[Pars I.: harum Publicationum Nr. 35.]

Compositae.

Eupatorium cannabinum L. var. Syriacum (Jacq.) Boiss.
Armenia Turcica: ad lacum Göl-Başı inter oppida Malatia et Mar'as,
inter frutices Rubi sancti, alt. ca. 1000 *m.* 12. X. 1910 (No. 3786).

Aster acris L. (= *Aster punctatus* Waldst. et Kit.)
(= *Galatea punctata* Cassin. = *Galatella punctata* Nees).
Taurus Armenus: traiectus de Ćuk inter pagos Chôšab et Baškala dit.
Wan, in herbidis alt. ca. 2100 *m.* 29. VIII. 1910 (No. 3499).

Erigeron Canadense L. Mesopotamia: in horto ad Kaşr Naķib
prope Baṛdād, ad limum. 27. IV. 1910 (No. 3518); in silvulis Salicum et
Populi Euphratici in ripa Tigridis ad oppidum Môşul frequens. 30. V.
1910 (No. 3517).

Erigeron pulchellum (Willd.) DC. Kurdistaniae Turcicae
distr. Hakkari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Haşıtha et
Şattak, in fissuris rupium calcaris nigri alt. ca. 2700—2750 *m.* 28. VII.
1910 (No. 3497).

Erigeron pulchellum (Willd.) DC. var. leucactis Boiss.
Cum praecedente (No. 3497a).

Erigeron Daënensis Vierh. (Vierhapper, Beihefte Bot. Zentral-
blatt XIX. 2. [1906] p. 514). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari:
Ĝelo-Daṛ dit. Ĝulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris calcaris
nigri alt. ca. 2800—2900 *m.* 3. IX. 1910 (No. 3519).

Erigeron Orientale Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari:
mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Haşıtha et Şattak, in pascuis
alpinis alt. ca. 2000 *m.* 28. VII. 1910 (No. 3513); traiectus inter pagos
Hoz et Chômar, in pascuis alpinis alt. ca. 2300 *m.* 30. VII. 1910 (No. 3509);
Taurus Armenus: Warak-Daṛ dit. Wan, in herbidis subhumidis ad Werin-
Warak alt. ca. 2300 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3510).

Erigeron amorphoglossum Boiss. Kurdistaniae Turcicae
distr. Hakkari: Ĝelo-Daṛ dit. Ĝulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, ad
nives tabescentes alt. ca. 2800 *m.* 4. IX. 1910 (No. 3519).

Erigeron Bovei (DC.) Boiss. Judaea: 'Ain Ĝidi (Engaddi) ad
litus occidentale Maris Mortui dit. Hebron, alt. ca. -230 *m.*, inter frutices
ad fontem. 26. V. 1909 (No. 3505); Moab: Hammâm ez-Zerķa (Kallirrhöe)
ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -200 *m.* 28. VI. 1909 (No. 3507).

Erigeron trilobum (Dec.) Boiss. Arabia Petrae: Petra (Wâdi Mûsa), ad rupes arenaceas prope Ed-Dêr. 19. VI. 1909 (No. 3508).

Erigeron linifolium Willd. Judaea: ad pagum El Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymae, inter rupes calcar. alt. ca. 700 *m.* 26. VII. 1909 (No. 3506).

Erigeron Aucheri (DC.) Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in valle fluvii Zab prope pagum Koçânes dit. Ğulamerik, in herbidis alt. ca. 1300 *m.* 2. IX. 1910 (No. 3512).

Lachnophyllum Noëanum Boiss. Armenia Turcica: inter pagos Kotni et Hasköi dit. Muş, in humidis alt. ca. 1400 *m.* 24. IX. 1910 (No. 3511).

Bellis perennis L. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: traiectus inter pagos Aradên et 'Ain Nûne dit. Amadia-Hasîtha, ad fontem alt. ca. 1450 *m.* 15. VI. 1910 (No. 3807); in eadem ditione ad fontem alt. ca. 900 *m.* 15. VI. 1910 (No. 3808); Armenia Turcica: ad pagum Nağarli prope oppidum Mar'aş, ad locum subhumidum alt. ca. 1100 *m.* 13. X. 1910 (No. 3805).

Bellis silvestris Cyrill. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolymam, inter rupes calcar. alt. ca. 700 *m.* 26. III. 1909 (No. 3810); Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in silvis Pini Halepensis alt. ca. 750 *m.* 12. X. 1909 (No. 3806); Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Şîrîn, inter rupes calcar. subhumidas alt. ca. 1100 *m.* 5. V. 1910 (No. 3809).

Bellis annua L. var. *minuta* DC. (= *Bellis microcephala* Lange). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Kaunak (Kônak) inter Šuštâr et Dizfûl, sub frutice Zizyphi nummulariae. 12. III. 1910 (No. 3514).

Asteriscus pygmaeus Coss. et Dur. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho et circa Jericho frequens; Arabia Petraea: Wâdi Kerak infra oppidum El-Kerak, ad terram nudam alt. ca. 200 *m.* 15. VI. 1909 (No. 3748); Mesopotamia: Kal'at Felûğa dit. Baḡdâd, ad solum arenosum. 18. XII. 1909 (No. 3751); Persia austro-occidentalis (Susiana): Kuh Beijât (= Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, ad solum arenosum in fauce Cherr-e-Nemek. 27. III. 1910 (No. 3749 et 3750).

Asteriscus graveolens (Forsk.) DC. (= *Odontospermum graveolens* Sch. Bip.). Moab: Hammâm ez-Zerķa (Kallirrhoe) ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -220 *m.* 28. VI. 1909 (No. 3917).

Pallenis spinosa (L.) Cass. Judaea: 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -200 *m.* 31. III. 1909 (No. 3916).

Chrysophthalmum montanum (DC.) Boiss. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Gorîa dit. S'ert, inter rupes calcar. alt. ca. 750 *m.* 16. VII. 1910 (No. 3918).

Codonocephalum Peacockianum Aitch. et Hemsley [Trans. Linn. Soc. Ser. III. 111 (1886)]. Capitula eis specim. Straussianorum in

monte Schuturunkuh lectorum subminora. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in humosis subhumidis alt. ca. 1900 *m* 30. VII. 1910 (No. 3972).

Inula Helenium L. Taurus Armenus: montes inter fluvios Šerkônes et Howaraš inter Baškala et Kočânes dit. Wan, in humosis subhumidis. alt. ca. 2100 *m*. 31. VIII. 1910 (No. 3606).

Inula macrocephala Boiss. et Ky. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in valle fluvii Bochtan prope pagum Šattak, alt. ca. 1000 *m*. 31. VII. 1910 (No. 3607).

Inula glandulosa Willd. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes dit. Wan, in pascuis alpinis alt. ca. 2700 *m*. 31. VIII. 1910 (No. 3502).

Inula salicina L. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, ad rivum Sapnika alt. ca. 800 *m*. 15. VI. 1910 (No. 3608).

Inula Oculus Christi L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, inter rupes calcareas alt. ca. 1800—2600 *m*. 28. VII. 1910 (No. 3609 et 3610).

Inula Hakkiarica Nábělek spec. nova. (Tab. I, fig. 2 et pag. 6, fig. 1—3.) [Sect. II. Bubonium DC. § 2. Lasiocarpae Boiss.] *Perennis, radix lignosa, nigra, in rupium fissuras descendens, pluriceps, ad collum foliorum emarcidorum basibus nigris vestita, foliorum rosulas steriles et caules floriferos edens. Folia rosularia lanceolato-spathulata, acutiuscula, glabra, in margine remote denticulata, crassiuscula, pallide viridia, in petiolum lamina sublongiorem sensim attenuata, nervo albido supra subcanaliculato, subtus prominente, percursa, cum petiolo 4—6 cm longa et 1—1.5 cm lata. Caules 12—15 cm alti, purpurascens, pilis albis, patentibus, e tuberculo ortis, hispidi, supra parce ramosi, ramis monocephalis. Folia caulina ad nervum subtus prominentem hispidula, margine ciliata, ceterum glabra, ovato-lanceolata, acuta, sessilia, subauriculata, caules semi-amplexantia, 3—4 cm longa et ca. 1 cm lata; folia ramorum floriferorum lanceolata, acuta, basi attenuata, diminuta, ca. 1.5 cm longa et 4.5 mm lata. Capitula magna, ca. 4 cm diametro tenentia, in folii summi axillo subsessilia. Involucri phylla exteriora foliosa, oblongo-lanceolata, acuta, 1—1.5 cm longa et 1—3 mm lata, in pagina superiore densius, inferiore parce hirsuta, in margine longe et dense albido-ciliata. Phylla intermedia anguste lanceolata, longe acuminata, densissime et longe albo-hirsuta, viridia, apice purpurascens, phylla intima lineari-lanceolata, acutissima, a basi ad medium hyalina, parce hirsuta, a medio ad apicem purpurea, longe et dense albo-villosa. Flosculorum marginalium ca. 18 mm longorum ligulae ca. 3 mm latae, 2—5-dentatae, involucrum duplo superantes. Flosculi tubulosi ca. 7 mm longi. Ovarium 10-costatum, breviter hirsutum, ca. 4 mm longum. Pappus setis 20—25 albidis, ca. 6 mm longis, brevissime plumosis, formatus. Achaenia desiderata.*

Ab *Inula Montbretiana* DC., ad cuius affinitatem pertinere videtur, differt caulibus multo minus hirsutis nec villososericeis, minus rigidis, ramosis nec monocephalis, foliis radicalibus brevius in petiolum attenuatis. *Inula Aucheriana* DC. differt caule altiore densius hirsuto, ad collum lanato, firmiore, superne tantum corymbose ramoso, pedunculis brevioribus.

Habitat in Kurdistaniae Turcaeae districtu Hakkari, in traiectu Tauri Armeni inter pagos Hoz et Chômar dit. Hašitha—Šattak, inter rupes graniticas alt. ca. 2300 m. Legi 30. VII. 1910 (No. 3504).

Inula crithmoides L. Syria: Râs Beirût prope oppidum Beirût, ad litus. 3. XI. 1910 (No. 3520).

Inula acaulis Schott et Ky. forma caulescens m.

Caules floriferos 4—20 cm altos, interdum superne ramosos, unifloros, rubros, longe et patule albo-villosos, foliosos, edens. *Folia caulina radicalibus forma similia, in margine denticulata ciliatula.*

Kurdistaniae Turcaeae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret ibn-Ômar, ad nives tabescentes alt. ca. 2000 m. 26. VII. 1910 (No. 3503).




Fig 1.

1—3. *Inula Hakkaria*. 4. *Picris desertorum*. *Achaenium*.

Inula viscosa (L.) Ait. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, locis aridis alt. ca. 700 m. 2. X. 1909 (No. 3521).

Inula graveolens (L.) Boiss. Cum praecedenti (No. 3516).

Inula divaricata Boiss. Mesopotamia: in horto ad Ğasr Naķib prope Baṛdâd. 27. IV. 1910 (No. 3493).

Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. var. *microcephala* Boiss. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, ad fontem alt. ca. -250 m. 26. V. 1909 (No. 3496).

Pulicaria undulata (L.) DC. (Cum specim. Schimperianis ex Wâdi Hebrân Arabiae Petraeae, No. 227, congruens.) Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui, ad thermas alt. ca. -200 m. 28. VI. 1909 (No. 3533); Wâdi ez-Zerka inter pagum Mâdaba et Hammâm ez-Zerka, ad rivulum alt. ca. 150 m. 28. VI. 1909 (No. 3914).

Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, ad terram nudam prope rivulos alt. ca. -250 m. 26. V. 1909 (No. 3915).

Pulicaria vulgaris Gaertn. Armenia Turcica: ad pagum Ćabachčûr inter oppida Muş et Charput, in ruderatis. 29. IX. 1910 (No. 3495).

Pulicaria crispa (Forsk.) Benth. et Hook. = *Francoeuria crispa* (Forsk.) Cass. Mesopotamia: in silvula Salicum et Populi Euphratici in ripa Tigridis infra oppidum Môsul. 30. V. 1910 (No. 3494).

Iphiona juniperifolia Cass. Arabia Petraea: Ġebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), ad rupes arenaceas alt. ca. 1200 m, 19. VI. 1909 (No. 3911); ad Ed-Dêr Petrae (Wâdi Mûsa) (No. 3912). Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë), ad rupes arenaceas alt. ca. -200 m. 28. VII. 1909 (No. 3913).

Sphaeranthus strobiliferus Boiss. et Noe. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3704).

Conyza Dioscorydis Rauw. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rivulum alt. ca. -150 m. 30. III. 1909 (No. 3799). Gallilaea: ad pagum Semach ad litus meridionale lacus Tiberiadis, inter frutices alt. ca. -200 m. 21. IV. 1909 (No. 3788). Arabia Petraea: Seil ed-Drâ inter El-Kerak et Et-Tafile, ad rivulum alt. ca. 200 m. 15. VI. 1909 (No. 3787).

Conyza Varthemioides Nábělek spec. nova. (Tab. I, fig. 3 et pag. 8. fig. 1—3.) *Perennis, suffruticosa, crebre ramosa. Rami tenues, erecti, vetusti glabri, tenuiter sulcati, brunnei, rami annotini tomento albido, deterrenti, vestiti. Folia inferiora oblongo-lanceolata, acutiuscula aut rarius apice rotundata, mucronulo brevissimo, crassiusculo, obtusiusculo, terminata, in petiolum brevem longe attenuata, plana, integra, subtus praesertim ad nervum medianum, in pagina inferiore prominentem, parcissime hirsuta et minutissime glanduloso-punctulata, in pagina superiore glaberrima, atro-viridia, cum petiolo 4—4.5 cm longa, et 8—10 mm lata. Folia superiora basi sensim attenuata sessilia, diminuta. Pedunculi 2—4 cm longi, solitarii, tenues, recti, glabri, monocephali, ex axillis foliorum superiorum orientes, bracteis minimas, triangulari-lanceolatas, usque setaceas, infra paucas, distantes, sursum sub capitulo approximatas, in involucri phylla sensim transeuntes, gerentes. Capitula discoidea, ovato-obconica, ca. 1 cm longa et fere aequilata, 30—50-flora. Involucris pluriserialis phylla imbricata, erecto-patentia, ab infimis, bracteis simi-*

libus, minimis, triangulari-lanceolatis, acutis, subsquarrosis, in superiora anguste lineari-lanceolata aut linearia, longe acuminata, acuta, glaberrima, nervo viridi percursa, in apice et in margine hyalina, dentibus porrectis minutissime denticulata, tenuissima, nitidula, sensim aucta. Receptaculum subconvexum, fere planum, nudum. Flosculi pallide violacei, exteriores feminei angustissime tubulosi, fere filiformes, ca. 5 mm longi, limbo in dentes 4 brevissimos, acutos, fisso. Stigmati lobi exserti, spathulato-dilatati. Flosculi centrales hermaphroditi, exterioribus paulo longiores, ca. 6 mm longi, tubo anguste cylindrico, ca. 4 mm longo, limbo anguste infundibuliformi, ca. 2 mm longo, in dentes triangulares, acutos, apice reflexos, fisso. Antherarum basi breviter et angustissime bicaudatorum tubus ca. 3 mm longus, limbum superans. Stigmati lobi exserti, quam ei flosculorum marginalium angustiores. Achaenia omnia conformia, cylindrica, teretia, basi breviter angustata, adpresse sericeo-hirsuta, griseo-brunnea, ca. 1.75 mm longa et 0.5 mm lata, pappo setis 5—7, albis, scabris, ca. 5 mm longis, persistentibus, coronata.

Habitu potius *Varthemiam* quendam quam *Conyzam* referens, sed propter flosculos exteriores femineos, involucrum polyphyllum, achaenia teretia, pappum paucisetum, stricte uniserialem, *Conyzae* nec *Varthemiae* adnumeranda. Ex *Varthemii* *Varthemiam Persicam* DC. refert, quae praeter distinctiones genericas differt ramis strictis, subvirgatis, pedunculis brevioribus et crassioribus, involucri phyllis brevius acuminatis etc.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae districtu Hakkiari, in montibus Ğelo dit. Ğulamerik, in valle Hawaspi, ad rupes calcareas inaccessas alt. ca. 1600 m. Legi 6. IX. 1910 (No. 3515).



Fig. 2.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Conyza Varthemiodes.

Phagnolon rupestre (L.) DC. Judaea: Bêt Ğemâl dit. Hierosolymae, in saxosis alt. ca. 500 m. 6. IV. 1909 (No. 3813). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), ad rupes. 25. III. 1910 (No. 3815). Kurdistania Persica: montes

supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şirîn, ad rupes alt. ca. 1200 *m.* 5. V. 1910 (No. 3814).

Gnaphalium luteo-album L. Judaea: 'Ain Dâk prope Jericho, ad rivulum alt. ca. -300 *m.* 31. III. 1909 (No. 3900). Libanon: ad monasterium Mâr Şâja prope pagum Brumâna supra urbem Beirût, ad fontem alt. ca. 700 *m.* 12. X. 1909 (No. 3901). Mesopotamia: Nahr Hosseinie prope Kerbelam, ad ripam. 16. IV. 1910 (No. 3899).

Helichrysum Pallasii (Spreng.) Boiss. = *Helichrysum callichrysum* DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: traiectus inter pagos Hoz et Chômar dit. Haşîtha—Şattak, ad rupes graniticas alt. ca. 2200 *m.* 30. VII. 1910 (No. 3870).

Helichrysum Pallasii (Spreng.) Boiss. var. *chionophilum* Boiss. = *Helichrysum chionophilum* Boiss. et Bal. Taurus Armenus: Warak-Dağ prope Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 2600 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3878).

Helichrysum pseudoplicatum Nábélek spec. nova. (Tab. I, fig. 4.) *E caudicibus induratis, prostratis, tenuibus, nudis, surculos steriles et caules floriferos edens. Caules recti, 15—25 cm alti, dense foliosi, basi purpurei, tenuiter sulcati, parvissime hirsuti, nitidi, supra straminei, parce hirsuti, sursum densius hirsuti et glandulosi, corymbo densiusculo 8—20-cephalo terminati, corymbi ramis et pedicellis breviter sed densissime crispe albo-hirsutis et glandulosi. Folia surculorum plana, oblongo-lanceolata aut spathulata, in petiolum longe attenuata, apice obtusa, plus minus dense araneoso-hirsuta et glandulosa, viridia aut canescentia usque albida. Folia caulina plana, plus minus dense hirsuta et glandulosa, inferiora anguste lanceolata, basin attenuata, superiora angustata, lineari-lanceolata, summa anguste linearia, acuta, sicca plicata. Capitula pedicellis eis plerumque subaequilongis, rarius brevissimis, densissime et breviter crispo-hirsutis, suffulta, ovato-cylindrica, 6—7 mm longa et 5—6 mm lata; involucri phylla 30—36, pallidissime citrina aut lactea, extima ovata, ca. 3 mm longa et 1.5 mm lata, interioribus ca. duplo breviora, intermedia ovato-lanceolata, subplana, 5—6 mm longa et 2—2.5 mm lata, intima lineari-lanceolata, plana, omnia acuta, glaberrima, nitida, laxiuscula, subsquarrosa. Pappus setis paucis albis brevissime plumosis formatus.*

A *Helichryso plicato* DC., cui affine esse videtur, differt capitulis minoribus, ovato-cylindricis nec globosis, phyllis exterioribus quam interiora ca. duplo nec triplo brevioribus et imprimis omnibus acutis.

Habitat in Persia boreali, ad cacumen Gerdene Kiara inter Ask et vallem Laar, ubi die 23. Junii 1843 a cl. Kotschy detectum fuit (No. 378, a cl. Boissier *Helichryso plicato* [?] adnumeratum, in *Fl. Orient.* non citatum); in Tauri Armeni monte Warak-Dağ prope Wan a cl. Kronenburg (No. 155) collectum, a cl. Freyn *Helichryso plicato* DC. var.

lacteo Boiss. adnumeratum. Ipse legi in Kurdistaniae Turcicae districtu Bervari: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, in lapidosis siccis alt. ca. 1200 *m*, 16. VI. 1910 (No. 3866); in districtu Hakkari: in monte Dwile supra pagum Hašitha, in lapidosis alt. ca. 2100 *m*, 18. VI. 1910 (No. 3874), et in monte Warak-Dar prope Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 2500 *m*, 23. VIII. 1910 (No. 3879).

Helichrysum lavandulaefolium (Willd.) Boiss. Forma minus dense et minus adpresse lanata. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Kêla Mamê supra pagum Hoz dit. Hašitha—Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2700 *m*. 28. VII. 1910 (No. 3876); traiectus inter pagos Hoz et Chômar, ad nives tabescentes alt. ca. 2500 *m*. 30. VII. 1910 (No. 3869). Taurus Armenus: mons Harefta, supra pagum Baraspi, inter Baškala et Kočânes, alt. ca. 2500 *m*. 30. VII. 1910 (No. 3877).

Helichrysum sanguineum L. Judaea: ad pagum Bêt Ğemâl dit. Hierosolymae, ad rupes calcar. alt. ca. 450 *m*. 6. IV. 1909 (No. 3880).

Helichrysum Aucheri Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr, Baba Ğiğik et Kân-i-Watman dit. Erbil (Arbela)—Rewandûz, ad rupes aridissimas alt. 700—900 *m*. 20. et 21. V. 1910 (No. 3864 et 3871). Assyria: ad pagum Maltaï inter pagos Tell Kef et Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, in fissuris rupium calcar. aridarum alt. ca. 400 *m*. 6. VI. 1910 (No. 3873); ad pagum Mâr Jakub dit. Môşul, ad rupes calcar. alt. ca. 750 *m*. 9. VI. 1910 (No. 3867).

Helichrysum Armenium DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Zôzan: ad pagum Bengof ad orientem ab oppido S'ert, in herbidis alt. ca. 800 *m*. 20. VII. 1910 (No. 3865 et 3868). Kurdistaniae Turc. distr. Hakkari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter Hašitha et Šattak, in herbidis aridis, alt. ca. 1600 *m*. 30. VII. 1910 (No. 3872), et supra pagum Hoz alt. ca. 1900 *m* (No. 3875).

Leyssera capillifolia (Willd.) DC. Arabia Petraea: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), ad terram arenosam alt. ca. 1150 *m*. 19. VI. 1909 (No. 3982).

Gymnarrhena micrantha Desf. Mesopotamia: ad Kal'at Fellûga dit. Bardâd, in arena mobili. 18. XII. 1909 (No. 3989); Babylon—Tell Bâbil, ad terram nudam, 18. IV. 1910 (No. 3985); Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, ad terram nudam arenosam alt. ca. 180 *m*. 2. V. 1910 (No. 3988). Kurdistania Turcica: ad pagum Salahîje (Kifri) inter Hanikîn et Kerkuk, ad rupes gypsaceas Šêch Zoar alt. ca. 350 *m*. 10. V. 1910 (No. 3986). Kurdistania Persica: Kâsr-i-Širîn dit. Hanikîn, ad terram nudam alt. ca. 550 *m*. 7. V. 1910 (No. 3987).

Gymnarrhena micrantha Desf. f. **rependo-dentata** *m*. *Folia remote rependo-dentata, dentibus linearibus, acutis 1.5—2 mm longis. Capitula avellanae maiora. Formis typicis integrifoliis intermixta in monticulis Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, ad terram nudam arenosam alt. ca. 180 m. 2. V. 1910 (No. 3988a).*

Gymnarrhena micrantha Desf. f. **angustifolia** m. *Folia lineari-lanceolata*, 4—7.5 cm longa et 3—6 mm lata, ad plantas iuveniles erecta. Capitula piso vix maiora. Persia austro-occidentalis (Susiana): Kuh Bejjât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem. In arena mobili. 27. III. 1910 (No. 3984).

Micropus longifolius Boiss. et Reut. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad rivum Cherr-eš-Šaucha inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), in glarea. 22. III. 1910 (No. 3884); ad fluv. Ćekâb inter Susa et Deilerûn, ad limum. 24. III. 1910 (No. 3897). Kurdistania Persica: ad Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, ad vias alt. ca. 550 m, 3. V. 1910 (No. 3882 a, forma nana aprica); ibidem in arvis f. typica (No. 3882). Kurdistania Turcica: in glarea rivi exsiccati inter pagos Salahije (Kifri) et Tuz Chormati dit. Hanikîn—Kerkuk, alt. ca. 200 m. 11. V. 1910 (No. 3881). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Choarra-Sia supra pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, in saxosis alt. ca. 1400 m. 16. VI. 1910 (No. 3888).

Micropus longifolius Boiss. et Reut. β *evacinus* Bornm. [Bornmüller: Bearbeitung der von Knapp im nordwestlichen Persien gesammelten Pflanzen, Verhandlungen d. Zoologisch-botan. Gesellschaft in Wien, Bd. LX (1910) p. 131.] Persia austro-occidentalis (Susiana): ad rivum Cherr-eš-Šaucha inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), in glarea. 23. III. 1910 (No. 3884 a). Kurdistania Turcica: ad pagum Salahije (Kifri) inter Hanikîn et Kerkuk, ad rupes gypsaceas Šêch Zoar alt. ca. 350 m. 10. V. 1910 (No. 3883).

Evax Anatolica Boiss. et Heldr. Judaea: Jericho, ad terram nudam aridissimam alt. ca. -250 m. 19. III. 1909 (No. 3894). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Šellelat dit. Šuštâr, ad limum, 9. III. 1910 (No. 3893). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: vallis Châne inter pagos Hašitha et Amadia, alt. ca. 900 m, 21. VI. 1910 (No. 3891).

Filago Germanica L. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymae, in agris alt. ca. 500 m. 3. IV. 1909 (No. 3895). Kurdistania Persica: Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in lapidosis alt. ca. 400 m, 3. V. 1910 (No. 3898). Kurdistania Turcica (Assyria): inter Salahije (Kifri) et Tuz Chormati dit. Kerkuk: in steppa alt. ca. 200 m. 11. V. 1910 (No. 3896).

Filago arvensis L. var. *lagopus* DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar supra Rewandûz dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 1000 m, 23. V. 1910 (No. 3885); districtus Berwari: ad pagum Aradên dit. Amadia, in agris alt. ca. 900 m. 14. VI. 1910 (No. 3886); ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, in monte Choarra-Sia, alt. ca. 1400 m. 16. VI. 1910 (No. 3889); distr. Hakkiari: ad pagum Hašitha dit. Ġulamerik, in agris alt. ca. 1400 m. 19. VI. 1910 (No. 3887); mons Dwîle supra pagum Hašitha, alt. ca. 1900 m. 18. VI. 1910 (No. 3892), mons Siares supra Hašitha, alt. ca. 1800 m. 19. VI. 1910 (No. 3890).

Eclipta alba (L.) Hausskn. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter.

Bidens tripartita L. Armenia Turcica: ad pagum Čabachčûr inter oppida Muš et Charput, in fossis alt. ca. 950 m. 29. IX. 1910 (No. 3501).

Xanthium strumarium L. Kurdistaniae Turcicae distr. Zôzan: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, in arvis et inter frutices alt. ca. 760 m. 19. VII. 1910 (No. 3825).

Xanthium spinosum L. Armenia Turcica: ad pagum Habusi dit. Charput, in agris incultis alt. ca. 950 m. 2. X. 1910 (No. 3826).

Achilleae specierum revisionem cl. Dr. A. Heimerl perfectus est.

Achillea Nábělekii nova spec. Heimerl (Tab. II.), Ex affinitate Achilleae setaceae W. K., a qua primo aspectu differt: *habitu robustiore, caule stricto, valido, foliis caulinis longioribus et evidenter latioribus, segmentis minus dense confertis, corymbo spectabili, valde multi- et densifloro, capitulis maioribus, involucri latius ovatis, phyllis f. concoloribus, ligulis utraque in facie albis, maioribus*. Habitat in Kurdistaniae Turcicae districtu Berwari, ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Aradên et Hašîtha, ad fossam irrigationis alt. ca. 1200 m, ubi legit 21. VI. 1910 cl. Dr. Fr. Nábělek (No. 3582).

Descriptio. *Caulis 35—60 cm altus, usque 5 mm crassus, simplex, leviter sulcatus, usque ad corymbum modice decrescens foliatus, internodiis usque 80 mm longis, pilis albis, longiusculis infra laxius, sursum paulo densius villosopubescentibus, corymbum paulo ultra 100 mm latum, compositum, floribundum, leviter convexum, condensatum gerens. Folia* caulina sessilia, usque 60 mm longa et (in dimidia laminae parte) usque 15 mm lata, oblonga, e basi lata caulem semiamplectentem sursum angustata, antice acutiuscula, tripinnatisecta, rhachide integra, ca. 1 mm lata, lamina laxius, versus insertionem tamen densius pilis albis, longiusculis villosopubescentes, segmentis primariis multis, \pm transversis et complicatis, ovato-triangularibus, segmentis secundariis 2—3 utrinque, eodem modo ultra partitis, segmentis ultimis anguste lineari-lanceolatis, in longitudine variantibus, in latitudine vix 0.5 mm attingentibus, in mucronem callosopalidum, valde acutum acuminatis, in pagina superiore glanduligeris. Capitula pedunculo vel illis longiore vel breviora, pubescente suffulta, 6—6.5 mm longa, cum ligulis expansis fere 7 mm lata. Involucria 5.5 mm longa, fere 4 mm lata, sordide straminea, paulum nitentia, phyllis ca. 3-seriatis, parcius hirtulis, fere concoloribus vel hinc inde in apice paululo brunnescentibus, inferioribus brevius lanceolatis, superioribus oblongius elliptico-lanceolatis, anguste scarioso marginatis. Paleae paulum ultra 4 mm longae, oblongo-lanceolatae, acutiusculae, concolores, in margine hyalinae, antice irregulare denticulatae, in dorso vel fere glabrae vel parce hirtulae, canale oleifero non conspicuo. Flores*

* Folia turionum desunt.

radiales ligulis albis 1·75—2 mm longis, 2·5—3 mm latis, ca. tertiam partem involucri altitudinis aequantibus, leviter tricrenatis instructi. Achaeonia (submatura) 2 mm longa, 0·75 mm lata, cuneata, in apice truncata, compressa, tenuissime (sub lente forte) striolata, membrana tenui albida, semine brunneo. (22. III. 1924.)

Achillea filipendulina Lam. var. *leptocline* DC. [Prodr. VI. 1837, p. 28.] Kurdistaniae Turcae distr. Hakkari: ad pagum Kočanes dit. Ğulamerik, in declivitate subhumida lapidosa supra rivum, alt. ca. 1600 m. Caules altitudinem 1·5 m attingentes, 5. IX. 1910 (No. 3591).

Achillea micrantha M. B. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Altunköpri inter Kerkuk et Erbil, in agris incultis alt. ca. 260 m. 17. V. 1910 (No. 3594); Ğebel Neft ad oppidum Kerkuk, in declivitatibus aridis argilosis, alt. ca. 300 m. 17. V. 1910 (No. 3587). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia alt. ca. 1100 m, vere 1911 leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3579).

Achillea micrantha M. B. f. *tenuisecta* Heimerl. Arabia Petraea: ad oppidum El-Kerak, in declivitatibus aridis saxosis alt. ca. 800 m. 13. VI. 1909 (No. 3576). Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Neft ad oppidum Kerkuk, in declivitatibus aridis argilosis alt. ca. 300 m, cum f. typica. 17. V. 1910 (No. 3587a).

Achillea micrantha M. B. f. *latisecta* Heimerl. Palaestina orientalis (Ammon): ad pagum Ammân (Rabbath Ammon), in agris alt. ca. 800 m. 17. IV. 1909 (No. 3592).

Achillea Santolina L. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad Deilerûn (Deh-i-Loran), in agris incultis. 26. III. 1910 (No. 3595). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia, alt. ca. 1100 m, vere 1911 leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3581).

Achillea vermicularis Trin. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Altunköpri inter Erbil et Kerkuk, in agris incultis alt. ca. 260 m. 17. V. 1910 (No. 3596). Kurdistaniae Turcae distr. Hakkari: ad pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in lapidosis inter agros alt. ca. 1700 m. 17. VI. 1910 (No. 3580). Taurus Armenus: inter pagos Şattak et Gurundaşt, in declivitatibus lapidosis alt. ca. 1800—1900 m. 31. VII. 1910 (No. 3586).

Achillea Damascena DC. (= *Achillea falcata* L. auctorum, quae descriptioni Linnéanae aliena [Heimerl]) Arabia Petraea: ad oppidum El-Kerak, in steppis lapidosis alt. ca. 800 m. 13. VI. 1909 (No. 3575).

Achillea conferta DC. Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Neft ad oppidum Kerkuk, in declivitatibus aridis argilosis alt. ca. 300 m. 17. V. 1910 (No. 3593). Mesopotamia: Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 m. 2. V. 1910 (No. 3498).

Achillea aleppica DC. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kasr-i-Şirîn, inter rupes alt. ca. 900 m. 6. V. 1910 (No. 3589).

Achillea fragrantissima (Forsk.) Sch. Bip. Arabia Petraea. in deserto lapidoso ad Ma'ân alt. ca. 700 m. 21. VI. 1909 (No. 3574).

Anthemis tinctoria L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: ad pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in graminosis alt. ca. 1900 m. 28. VII. 1910 (No. 3602). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia, vere 1911 leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3603).

Anthemis rigida Nábělek spec. nova. (Tab. II, fig. 2, pag. 15, fig. 7—14.) Sect. I. Cota Boiss. Bienn. *Radix* verticalis, tenuis, supra ca. 2.5 mm crassa, ad collum rosulam foliorum anni primi, florendi tempore iam siccorum, gerens, caulem unicum 20—40 cm altum edens. *Caulis* pilis albis, brevibus, puberulus et parce glandulosus, 8—12-costatus, costis tenuibus, prominulis, acutis, a basi ad medium vel ad plantas densius satas solum superne ramosus, ramis firmis, rectis, erecto-patulis, unifloris, 15—20 cm longis. *Folia* rosularia petiolo anguste alato, basi dilatato, suffulta, ambitu oblonga, 4—5 cm longa et 1.5—2 cm lata, in lacinias lineari-lanceolatas, acutiusculas, brevissime calloso-mucronulatas, remotas, bipinnatifartita, rhachide integra, lacinulas paucas gerente, parce puberula et glandulosa. *Folia caulina* sessilia, basi auriculata, auriculis lineari-lanceolatis caulem amplexentia, ambitu quam basalia latiora, ceterum eis similia, ca. 3 cm longa et 2 cm lata; summa diminuta. *Pedunculi* 6—8 cm longi, sursum parum incrassati, sub capitulo densius albo-hirtelli, parce glandulosi.

Capitula involucrio turbinato-orato suffulta, plana aut postea paulum convexa, absque radiis 10—12 mm diametro tenentia et 8—10 mm alta. *Involucri phylla* ab externis oratis, ca. 4 mm longis, ad intima, oblonga-lanceolata, ca. 6—7 mm longa, sensim aucta, omnia acuta, pallide flavescentia, parce albido-hirsuta, exteriora anguste, interiora latius fuscescens, dense et longe fusco-ciliata. *Receptaculum* primum planum, tum leviter convexum. *Paleae* planae, spatulato-obovatae, truncatae vel retusae, abrupte in cuspidem eis quarta vel tertia parte brevior, vix pungentem, abeuntes, flosculorum tubum vix superantes, ca. 2.5 mm latae et absque cuspidem ca. 4 mm longae, cuspides 1—2.75 mm longae. *Flores* omnes fertiles, radii feminei ca. 10—12, tubo brevissimo, compresso, ligulis albis, orato-ellipticis, minime, obtuse, trilobulis, non reflexis, ca. 12 mm longis et 6—6.5 mm latis, epidermide valde papillosa. *Flores disci* numerosi, lutei, tubo ca. 2 mm longo, spongioso, compresso, bialato, limbo ca. 4.5 mm longo, infundibuliformi, in lobos breviter triangulares, acutos, patulos, vix 1 mm longos, fisso. *Achaenia* omnia conformia, glabra, leviter, valde compressa, margine acuta, vix tetragona, utrimque tenuiter 10-costata, immatura pallide fusca, recta, basi cuneata, apice truncata, ca. 3 mm longa et 1 mm lata, corona dorso latiore, fere 1 mm lata, ventre angustiore, albida, irregulariter denticulata, superata.

Species in dispositione Boissieriana inter sectionis Cota species biennes collocanda, *Anthemidi* rigescenti Willd. proxima esse videtur, a qua praeter ceteras notas differt statura humilior et gracilior, foliorum laciniis multo angustioribus, indumento fere nullo, involucri

turbinato-ovatis, phyllis multo minus hirsutis atrofusco marginatis, paleis multo latoribus, apice plerumque truncatis, rigidioribus.

Habitat in Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kâsr-i-Šîrîn, in graminosis alt. ca. 1200 m, 5. V. 1910 (No. 3599); in Kurdistaniae Turcicae districtu Šerizor: Handrian-Dağ supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis alt. ca. 900 m. 23. V. 1910 (No. 3625).




Fig. 3.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

7.—14. *Anthemis rigida*. 7. Flosculus ligulatus. 9. 14. Flosculi tubulosi. 8. Achaenium. 10, 11. Paleae. 12, 13. Involucrum phylla.

Anthemis altissima L. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Aradên et Hašîtha, ad fossas irrigationis alt. ca. 1200 m. 21. VI. 1910 (No. 3621).

Anthemis montana L. var. *Anatolica* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Siars supra pagum Hašîtha, in lapidosis alt. ca. 1500 m. 19. VI. 1910 (No. 3601).

Anthemis arvensis L. Palaestina: Hierosolymae, in hortis, alt. ca. 750 m. 12. IV. 1909 (No. 3611). Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3631). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad radices montium Kuh Beijât (Ğebel Hamrin) inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem, in alveolis frequentissima. 28. III. 1910 (No. 3631 a). Kur-

distania Turcica (Assyria): in pago Tuz Chormati inter Salahije (Kifri) et Kerkuk, alt. ca. 200 m. 12. V. 1910 (No. 3632).

Anthemis Armeniaca Freyn et Sint. [Bull. Herb. Boiss. III. (1895) p. 348.] Armenia Turcica: ad oppidum Malatia, in agris, leg. Fr. Anastase Cadell. (No. 3618).

***Anthemis Susiana* Nábělek** spec. nova. (Tab. III, fig. 1, pag. 19, fig. 13—18.) Sectio *Euanthemis* Boiss. Series B *Leianthae* Boiss. *Annua, radice brevi, tenui, verticali, e collo caules plures, diffusos, 6—10 cm longos, ascendentes, edens. Caules a basi sursum sensim incrassati, a basi ad medium ramosi, subtiliter 6—8-costati, adpresse puberuli, a basi supra medium foliosi. Folia petiolo lamina ca. duplo breviora suffulta, ambitu lanceolato-ovata, cum petiolo ca. 2—3 cm longa et 0.5—1 cm lata, in lacinias paucas, remotas, simplices aut hic inde lacinula brevi auctas, fere lineares, obtusiusculas, mucrone calloso, brevissimo, triangulari, terminatas, pinnatisecta, pilis crispulis, albis, parce obtecta. Pedunculi 3—4 cm longi, sursum sensim incrassati, sub capitulo ca. 2 mm crassi. Capitula florifera paulum convexa, tum ovato-globosa, absque radiis 8—10 mm lata et fere aequilonga. Involucri phylla extima interioribus fere duplo breviora, ca. 2 mm longa, ovata, obtusiuscula, interiora ca. 4 mm longa et fere 1.5 mm lata, spathulata, obtusissima, late hyalino-marginata, nervo centrali, viridi percursa, in margine irregularite rlace-rosa, apice pallide flavo-brunnea, dorso albo-villosula. Receptaculum altum, conicum. Paleae omnes conformes, spathulatae, in mucronem brevissimum abrupte abeuntes, subcarinatae, membranaceae, nervo viridiusculo percursae, ca. 3.5 mm longae, achaenia subduplo superantes. Flores omnes fertiles, radii feminei 8—10, tubo brevissimo, subcompresso, subalato, vix 1.5 mm longo, ligulis late ovatis, obtusissime trilobulis, ca. 10 mm longis et 6 mm latis, mox reflexis. Flores disci hermaphroditi, lutei, persistentes, tubo subcompresso, anguste bialato, limbo anguste infundibuliformi, fere tubuloso, in lobos longe acuminatos, acutos, reflexos, fisso. Achaenia omnia conformia, flavida, hirtella, obconica, paulum incurcata, tenuiter sulcata, levia, apice truncata, coronula minima unilateralis, dentibus tribus suberectis, obtusis, formata, superata, ca. 2 mm longa.*

Species haec in dispositione Boissieriana inter § 1 *Leianthas*, * * achaeniis apice truncatis, calvis, vel margine brevi obsitis, + + ligulis fertilibus, b) involucri phyllis omnibus obtusis, late scariosis, locanda, achaeniis *Anthemidi hyalinae* DC. similis, a qua differt praeter ceteras notas foliorum pinnatisectorum laciniis paucis, distantibus, elongatis, nec minimis, confertis, involucri phyllis a basi ad apicem nec basi tantum hirtis, nullis orbiculatis.

Habitat in Persia austro-occidentali (*Susiana*): in sabulis fluv. Šaur ad ruinas Susorum. 22. III. 1910 (No. 3635), in glarea rivi Čekâb et rivi Cherr eš-Šauchâ eiusdem ditionis, 23. et 24. III. 1910 (No. 3622 et 3623).

Anthemis Cotula L. Mesopotamia: ad oppidum Môşul, in silvulis Salicum et Populi Euphratici in ripa Tigridis, 30. V. 1910 (No. 3639).

Anthemis pseudocotula Boiss. Moab: Wâdi el Hsâ et Wâdi Môğib inter Mâdaba et El-Kerak, ad rivulos alt. ca. 200 *m*. Formae albolanatulae. 16. et 25. VI. 1909 (No. 3613 et 3616). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr), ad confluentes fluvios Âb-i-Şoteit et Âb-i-Girgir, ad ripas frequentissima. Forma minus hirsuta, viridis. 8. III. 1910 (No. 3628). Ruinae Susorum, el-Ķasr, formae simplicis uni- vel pauciflorae, erectae. 13. III. 1910 (No. 3637).

Anthemis odontostephana Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): Deilerûn (Deh-i-Loran), ad fontem naphtae, 26. III. 1910 (No. 3634); in montibus Kuh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara, 27. III. 1910 (No. 3624).

Matricaria Chamomilla L. Gallilaea: in monte Ithabure (Tabor) frequentissima. 4. V. 1909 (No. 3626). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad viam ad pagum Kônak inter oppida Šuštar et Dizfûl, 11. III. 1910 (No. 3638 *a*). Mesopotamia: ad ripam Tigridis prope Môşul frequens. 30. V. 1910 (No. 3638).

Matricaria aurea (L.) Boiss. Moab: Wâdi Môğib (Arnon), ad rivulum alt. ca. 200 *m*. 25. VI. 1909 (No. 3615). Persia austro-occidentalis (Susiana): in ruderalis ad pagum Kônak (Kaunak) inter oppida Šuštar et Dizfûl. 11. III. 1910 (No. 3627); ad radices monticulorum Kûh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, in alveolis et fossis forma prostrata frequentissima, odoratissima. 28. III. 1910 (No. 3633). Kurdistania Persica: in ruderalis ad pagum Ķasr-i-Şirîn alt. ca. 400 *m* frequens.

Matricaria praecox (M. B.) DC. [= *Chamaemelum praecox* Vis.] Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâz et Šuštar, in ripa fluvii Kârûn frequentissima. 8. III. 1910 (No. 3629).

Matricaria auriculata (Boiss.) Benth. et Hook. [= *Chamaemelum auriculatum* Boiss.] Palaestina: in ruderalis ad Jericho, alt. ca. -250 *m*. 19. III. 1909 (No. 3614).

Matricaria microcephala (Boiss.) C. Koch [= *Chamaemelum microcephalum* Boiss.] Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Mongeş in valle Sapna inter Zacho (Azach) et Amadia, in collibus argiosis siccis inter frutices *Quercuum* alt. ca. 800 *m*. 23. VI. 1910 (No. 3584). Taurus Armenus: ad pagum Gurundaşt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 *m*. 1. VIII. 1910 (No. 3585).

Matricaria (*Chamaemelum*) *melanophylla* Nábělek spec. nova. (Tab. II, fig. 3, pag. 19, fig. 1—7.) *Perennis, e rhizomate in fissuras rupium descendenti caudices induratos, tenues, atros, nudos, 2—4 cm longos, surculos steriles et caules floriferos edens. Caules ascendentes,*

a basi ad medium parce foliosi, superne nudi, monocephali, virides, tenuiter striati, parcissime adpresse hirtelli, cum pedunculis 8—12 cm longi. Folia surculorum sterilium et caulium floriferorum conformia, basalia petiolo eis ca. $\frac{1}{2}$ breviora, basi vaginanter dilatato, suffulta, ca. 5.5 cm longa et 2 cm lata, superiora sessilia, ambitu obovata aut oblonga, pinnatisecta, laciniis infimis foliorum basaliū filiformibus, intermediis anguste linearibus aut lineari-lanceolatis, acutissimis, superioribus in lacinulas inferioribus similes pluries partitis. Capitula magna, radiata, absque radiis ca. 1.5 cm diametro tenentia. Involucri glabri phylla exteriora interioribus paulum breviora, elliptica, obtusa, nervo mediali flavo excepto omnino nigro-scariosa, in margine irregulariter denticulato-lacerosa, ca. 5 mm longa et 3 mm lata, intermedia exterioribus aequilonga et aequilata, ovato-elliptica, dorso flava, latissime nigro-marginata, margine lacerosa, intima ca. 6 mm longa et 2 mm lata, spathulato-oblonga, basin attenuata, obtusa, nigro-marginata. Receptaculum conicum. Florum radiantium femineorum (an sterilium?) tubus ca. 2 mm longus, ligula alba, lineari-oblonga, apice obtuse et minute 3-dentata, ca. 10.5 mm longa et 3 mm lata. Ovarium ca. 2 mm longum, glabrum, costis ventralibus tenuissimis percursum, leve, ecoronatum. Flores disci numerosi, lutei, cum ovario ca. 4.5 mm longi, tubo subnullo, limbo cylindrico, in lobos triangulares, rectos, apice nigros, acutiusculos, ad ca. $\frac{1}{4}$ suae longitudinis fissos. Achaenia marginalia ignota, cetera nondum matura grisea, obconica, leviter curvata, ventre prominenter tricostata, dorso ecostata, leria, nitidula, apice truncata, corona in latere ventrali usque ad basin fissa, in latere dorsali profunde retusa, et ideo fere auriculas duas, rectas, irregulariter crenato-dentatas, achaenii longitudinis dimidium aequantes formante, terminata.

Species propter achaenia nondum matura imperfecte nota, *Matricariae grandiflorae* C. Koch (= *Chamaemelum caucasicum* Boiss., *Chrysanthemum caucasicum* Pers.) proxima esse videtur, a qua differt praeter ceteras notas caulibus et pedunculis brevioribus, ascendentibus nec erectis, involucris phyllis nigro-marginatis nec fuscis, receptaculo conico nec hemisphaerico, corollae lobis apice nigris. *Matricaria* (*Chamaemelum*) *oreades* Boiss. var. *Kotschy* Boiss., habitu speciei nostrae similis, differt achaeniis dorso levibus nec ruguloso-costatis, caulibus longioribus et tenuioribus, densius pubescentibus, foliorum laciniis angustioribus, phyllis angustius fusco-marginatis.

Habitat in Kurdistaniae Turcaeae districtu Ramorân: Halakur-Dar ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, ad nives tabescentes alt. ca. 2500 m, 26. VII. 1910 (No. 3568); districtus Hakkîari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz, inter pagos Haşîtha et Şattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2700 m, 28. VII. 1910 (No. 3566); Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Başkala et Koçânes, inter rupes alt. ca. 2700 m. 31. VIII. 1910 (No. 3567 et 3617).



Obr. 4.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—7. *Matricaria melanophylla*. 1. Folium radicale. 2, 3. Flosculi. 4, 5, 6. Invollucry phylla. 7. Achaenium. 8—12. *Chrysanthemum balsamitoides*. 8. Granum pollinis. 9, 10. Flosculi. 11. Folium radicale. 12. Corona achenii. 13—18. *Anthemis Susiana*. 13, 16. Flosculi. 17. Flosculi tubulosi limbus. 15. Achaenium. 14. Paleae. 17. Involucry phyllum. 19—20. *Cynara Kurdica*. 19. Achaenium. 20. Involucry phyllum intimum.

Chrysanthemum segetum L. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymae, inter segetes alt. ca. 350 m frequens, 3. IV. 1909 (No. 3604); Gallilaea: planities Esdrelon. in graminosis humidis ad Tell el-Mutesselem (Megiddo) dit. Ğenîn frequens. 3. V. 1909 (No. 3605).

Chrysanthemum coronarium L. Palaestina: Jericho, inter segetes alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 3600).

Chrysanthemum Kotschyi (Boiss.) Nábělek comb. nova = *Pyrethrum Kotschyi* Boiss. Kurdistaniae Turcaeae distr. Hakkari; mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašîtha et Šattak, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2750 m. 28. VII. 1910 (No. 3569); Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium calcaris nigri alt. ca. 2900 m. 3. IX. 1910 (No. 3573).

Chrysanthemum Kotschyi (Boiss.) Nábělek var. nova **griseum** Nábělek. (Tab. V, fig. 1.) *Differt a typo indumento totius plantae tenuiore, foliorum laciniis longioribus, tenuioribus et numerosioribus (12—18), caulibus elatioribus, 15—22 cm longis, a basi ad medium foliosis. Adsunt huius varietatis formae duo: forma grandiflora capitulis absque radiis 12—15 mm latis, et forma parviflora capitulis 5—10 mm diametro tenentibus. Planta aromatica, valde amara.*

Habitat in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra inter rupes calcaris nigri alt. ca. 2900 m forma grandiflora, 3. IX. 1910 (No. 3573a); in Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2450 m forma parviflora. 26. VII. 1910 (No. 3565).

Chrysanthemum (Pyrethrum) **Zahlbruckneri** Nábělek sp. nova. (Tab. IV, pag. 21, fig. 1—6.) Perenne. *Rhizoma* lignosum, atro-fuscum, breviter pluriceps, radicibus longissimis in solum lapidosum verticaliter descendentibus, caules plures, erectos, pluricephalos et surculos steriles edens. *Caules* herbacei, basi foliorum emarcidorum petiolis dilatatis, flavis, infimis nigrescentibus, vestiti, erecti, parce albo-pilosi, prominule albo-costati, foliosi, supra medium corymbose 2—5-ramosi, rarius monocephali, 35—40 cm (rarius 20 cm), alti. *Folia* radicalia et surculorum sterilium petiolo laminae aequilongo aut ea usque duplo longiore, 6—10 cm longo, tenui, adpresse basin parce, sursum densius albo-piloso, basi in vaginam brevem, flavidam, dilatato, supra canaliculato, albide tricostato, suffulta. *Lamina* ambitu late obovata aut oblonga, pinnatisecta, segmentis iterum in lacinias lanceolato-lineares, integras, acutissimas, parcissime pilosas, pinnatisectis aut bipinnatisectis, rhachide angustissima, integra, subtus parce pilosa. *Folia* caulina radicalibus similia, inferiora petiolata, superiora sessilia, basi auriculis anguste linearibus, acutis, in utroque latere 3—4, auriculata, sursum sensim diminuta, summa, corymbi ramos fulcrantia, in lacinias 3—5, ad ramos ipsos ad lacinulam unicam reducta. *Corymbi* rami firmi, suberecti, albo-costati, parce pilosi, 5—12 cm longi. *Capitula* magna, cum radiis 3.5 usque fere 5 cm diametro tenentia, absque radiis ca. 1.5 cm lata et fere 1 cm alta, subhemisphaerica, basi subimpressa, parum convexa. *Involucri* phylla numerosa, exteriora ovato-lanceolata, acutiuscula, dorso convexo albo-hirsuta, linea mediali nigra percursa, ceterum flavida, late nigro-scariosa, in margine laceroso-ciliata, ca. 5 mm longa et 2.5 mm lata; interiora longiora, ca. 7 mm longa et 3 mm lata, oblonga, obtusa, flavida, a medio late atro-scariosa, laceroso-ciliata, extus albo-hirsuta. *Receptaculum* convexum. *Flores* radii feminei 10—14, albi, tubo brevissimo, vix 1 mm longo, ligulis elliptico-obovatis, apice minime et obtuse trilobulis, patentibus, ca. 20 mm longis et 10 mm latis; flores disci hermaphroditi, lutei, numerosissimi, persistentes, tubo cylindrico, ca. 1.5 mm longo, limbo campanulato-infundibuliformi, ca. 2.5 mm longo, ad ca. $\frac{1}{3}$ in lobos triangulares, obtusiusculos, erecto-patulos, fisso. *Achaenia* nondum matura omnia conformia, atra, obscure pentagona, basi attenuata, subincurva, decemnervia, nervis prominulis et obscuris alternantibus, minutissime tuberculata, glandulis sessilibus, aureis, parce obsita, apice truncata, coronula brevissima, marginiformi, vix 0.5 mm alta, denticulata, terminata, ca. 5 mm longa et 2 mm lata.

Ex affiniatē *Chrysanthemi corymbosi* L. esse videtur, a quo praeter ceteras notas differt caulibus gracilioribus, oligocephalis, indumento multo parciore, capitulis longius pedunculatis, maioribus, foliorum laciniis integris nec serratis neque dentatis, involucri phyllis nigro-scariosis. *Chrysanthemum Cassium* (= *Pyrethrum Cassium* Boiss.), parce hirtellum, involucri phyllis pallidis, ligulis disco aequilongis, achaeniis corona elongata terminatis, pedunculis longioribus, discernitur.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae districtu Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha, in lapidosis in latere septentrionem spectante, alt. ca. 1700—1800 m. 21. VI. 1910 (No. 3598).




Fig. 5.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—6. *Chrysanthemum Zahlbruckneri*. 1. Folium radicale. 2. Flosculus ligulatus. 3. Flosculus tubulosus. 4. Achaenium. 5, 6. Involucri phylla.

Chrysanthemum praealtum Vent. var. *canescens* Boiss. (= *Pyrethrum parthenifolium* Willd. var. *canescens*). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Dwile supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, in saxosis granit. alt. ca. 1700 m. 18. VI. 1910 (No. 3641).

Chrysanthemum Persicum (Boiss.). Nábělek comb. nova = *Pyrethrum Persicum* Boiss. = *Pyrethrum parthenifolium* Willd. ♂ *persicum* Bornm. [Cf. Bornmüller, *Plantae Straussianae*, Beih. Bot. Centralbl. XX. 2. p. 154]. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiektus Serderian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, inter rupes humidās ad torrentem alt. ca. 800 m. 24. V. 1910 (No. 3642); Taurus Armenus:

traiectus Čuk inter Wan (Chôšab) et Baškala ad ripam lapidosam rivi alt. ca. 2200 m. 8. IX. 1910 (No. 3640).

Chrysanthemum (Pyrethrum) Balsamita L. f. glabrescens m. *Caules parce et adpresse pilosi, folia primum adpresse sericea, tum glabrescentia, omnia basi attenuata, infima longe, superiora brevius petiolata, summa diminuta, sessilia. Corymbi 6—12-capitati, capitulis radiatis, involucri phyllis apice fusciscentibus, parce hirtulis.* Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in graminosis humidis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 3571).

Chrysanthemum (Pyrethrum) Balsamita L. var. tanacetoides Boiss. *Involucri phylla parce hirta, omnino flavescientia, intima apice latissime hyalino-scariosa.* Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in graminosis humidis et ad ripam rivi frequens, alt. ca. 1900 m. 28. VII. 1910 (No. 3572).

Chrysanthemum (Pyrethrum) balsamitoides Nábělek sp. nova. (Tab. V, fig. 2.) *Perenne, e rhizomate lignoso, nigro, obliquo, ca. 5 mm crasso, pluricipite, caules complures, rectos vel ascendentes, edens. Caules herbacei, teretes, prominule 5—6-costati, inferne glabri, supra inter costulas parce et adpresse pilosuli, firmi, superne aut rarius iam supra medium corymbose pauciramosi, corymbis 2—8-cephalis, vel rarius uniflori, tota longitudine foliosi, 20—35 cm alti. Folia radicalia petiolo laminam aequante vel eam superante suffulti, lamina obovata, obtusa, grosse et irregulariter serrata, in petiolum cuneatim attenuata, glabra, aut pilis albidis hic inde sparsis praedita, crebre perlucide punctulata, nervis subtus prominulis percursa, 2—4 cm longa et 1—1.5 cm lata; folia caulina sensim diminuta, inferiora petiolata, superiora sessilia, basi plerumque angustata, rarius rotundata. Pedunculi tenues, 2—3 cm longi, parcissime adpresse pilosuli. Capitula mediocria, cum radiis ca. 2 cm diametro tenentia, absque radiis ca. 8 mm lata et 4 mm alta, subhemisphaerica, basi paulum impressa. Involucri phylla exteriora atropurpurea, triangulari-lanceolata, acuta, parcissime hirtella, parce glandulose albo-punctulata, apice hyalino-scariosa, laceroso-ciliata, fere penicillata, ca. 4 mm longa; interiora oblonga, obtusa, apice solum atrata et late hyalino-scariosa, lacerata, ca. 5 mm longa. Receptaculum planum aut parum convexum. Flosculi radii feminei ca. 16, tubo ca. 1.5 mm longo, compresso, bialato, ligulis albis, obovato-ellipticis, apice obtusa minime, obtuse 3-lobulatis, ca. 6 mm longis et 3.5 mm latis. Flosculi disci numerosi, lutei, ca. 2.5 mm longi, tubo compresso, bialato, limbo fere cylindrico aequilongo, in lobos triangulares, obtusos, apice subincurvos, ad quartam fere partem fissos. Ovaria omnia conformia, ca. 1.5 mm longa, glabra, minime glanduloso-punctata, tubo aequilata, basi attenuata, costis 5 prominulis subpentagona, corona brevi, alba, quinqueloba, lobis dentibus 3—5 terminatis, coronata. Planta aromatica, odoratissima.*

Ex affinitate proxima *Chrysanthemi Balsamitae* L. esse

videtur, a quo statura humiliore, caulibus minus firmis, indumento parcellissimo, foliis radicalibus in petiolum attenuatis nec subcordatis, capitulis maioribus, corymbis paucifloris, corona latiore, manifesta, nec marginiformi, differt.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae districtu Hakkari: in monte Kêla Mame supra pagum Hoz, inter pagos Hašîtha et Šattak, ad rupes calcar. alt. ca. 2600 m, 28. VII. 1910 (No. 3572), et in monte Harefta in Tauro Armeno inter pagos Baškala et Kočânes, alt. ca. 2700 m. 31. VIII. 1910 (No. 3570).

Chrysanthemum myriophyllum (Willd.) Nk. comb. nova, = *Tanacetum myriophyllum* Willd., = *Pyrethrum myriophyllum* C. A. Mey., Boiss. var. *eriocephalum* Boiss. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Qasr-i-Širîn, alt. ca. 1700 m. (?), nondum florens). 5. V. 1910 (No. 3597).

Chrysanthemum Sinaicum (Del.) Nk. comb. nova = *Tanacetum Sinaicum* Delile, = *Pyrethrum santolinoides* DC., Boiss, Moab: Wâdi Môğib (Arnon), inter Mâdaba et El-Kerak, ad rupes calcar. aridissimas alt. ca. 500 m. 25. VI. 1909 (No. 3577); Arabia Petraea: ad pagum Eš-Šôbak inter El-Kerak et Petram, ad rupes calcar. alt. ca. 550 m. 22. VI. 1909 (No. 3578).

Chrysanthemum (*Pyrethrum*) *argenteum* Willd. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašîtha, alt. ca. 1600 m. 16. VI. 1910 (No. 3590).

***Chrysanthemum* (*Pyrethrum*) *Heimerlei Nábëlek* spec. nova.** (Tab. I, fig. 1.) *E rhizomate lignoso, crasso, obliquo, pluricipite, vaginis foliorum vetustorum subinflatis, atro-brunneis, vestito, caules floriferos et surculos steriles edens. Caules recti, firmi, pilis albis, crispis, basin dense, sursum parcius tomentoso-hirsuti, costis prominulis, albidis, compluribus striati, a basi ad medium aut paulo supra medium folia 3—4 gerentes, superne nudi, corymbo denso, polycephalo (usque 80-cephalo) terminati. Folia radicalia petiolo basi in vaginam subinflatam, flavam, longe hirsutam, dilatato, dense et adpressiuscule griseo-hirsuto, 5-costato, supra canaliculato, laminae longitudinem subaequante aut eam paulo superante, 4—6 cm longo suffulta. Lamina ambitu oblonga, 4—7 cm longa, 2.5—5 cm lata, in lacinulas lineari-lanceolatas, rarius oblongas, acutas griseo-tomentosas, tripinnatisectas. Folia caulina radicalibus similia, sessilia, superiora valde diminuta. Capitula pedunculis dense griseo-tomentosis, eis aequilongis, bracteis lineares, hirsutas, gerentibus suffulta, ovato-cylindrica, ca. 5—6 mm longa et 3 mm lata. Involucri phylla flava, dense et longe albo-hirsuta, exteriora ovata, obtusa, ca. 2 mm longa et 1.5 mm lata, longe laceroso-ciliata, interiora oblongo-spathulata, obtusa, a medio ad apicem late hyalino-scariosa, lacerosa, ca. 5 mm longa et 2 mm lata. Flosculi 30—40, omnes hermaphroditi, tubulosi, quinquelobati, tubo compresso, bialato, glanduloso, ca. 1.5 mm longo, limbo cylin-*

drico, in lobos oratos, obtusiusculos, erectos, brevissimos, fisso, ca. 1.5 mm longo. Achaenia immatura prominule 5-costata, subincurva, basi attenuata, minutissime tuberculata, inter costas glandulifera, coromula brevissima, denticulata, terminata.

Habitu *Chrysanthemum myriophyllum* refert, a quo imprimis flosculis omnibus hermaphroditis et foliorum lacinulis acutis nec obtusis differt. In dispositione Boissieriana inter *Pyrethra* § 4 *Tanacetum* ** capitulis homogamis collocandum, sed foliorum forma etc. ab omnibus huius sectionis speciebus distinctum.

Habitat in Tauri Armeni monte Warak-Dağ prope Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 2600 m. 23. VIII. 1910 (No. 3588).

Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: vallis fluv. Zab prope pagum Koçânes dit. Ğulamerik, in lapidosis alt. ca. 1300 m. 7. IX. 1910 (No. 3476). Armenia Turcica: Mezre prope Charput, in ruderatis. 3. X. 1910 (No. 3486 a).

Artemisia Herba alba Asso. Kurdistania Turcica Mesopotamiae contermina: Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, frequens, ad pagum Kezrabad alt. ca. 200 m. 30. IV. 1910 (No. 4382 a); in steppis et agris sterilibus inter Kerkuk et Erbil (Arbela); ad Altunköpri alt. ca. 300 m, 17. V. 1910 (No. 3483 a) Tur Abdîn (Ğebel et Tûr): in steppis et agris sterilibus ad Midiat, alt. 900—1000 m, 8. VII. 1910 (No. 3481 a).

Artemisia fragrans Willd. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in marginibus agrorum et in decliv. lapidosis alt. ca. 1850 m frequens. 1. VIII. 1910 (No. 3482); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: in valle Âv Koçânes prope pagum Koçânes, dit. Ğulamerik, alt. ca. 1450 m et in valle fluv. Zab prope Koçânes, in lapidosis alt. ca. 1300 m, 1. et 2. IX. 1910 (No. 3483 et 3489).

Artemisia fasciculata M. B. Armenia Turcica: Topra Kaleh prope Wan, in agris sterilibus alt. ca. 1800 m frequens. 17. VIII. 1910 (No. 3475).

Artemisia Austriaca Jacq. var. *orientalis* DC. *Inter Artemisiam Austriacam Jacq. typicam capitulis minoribus et Artemisiam Turczanowianam Boiss. capitulis ac in nostra specie maioribus praeditam fere intermedia*, specim. Kotschyanis ad margines viae inter Koweg et Kestrian 4800' lectis [Iter cilicico-kurdicum No. 321] simillima. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, inter rupes alt. ca. 1850 m frequens. 1. VIII. 1910 (No. 3481); in valle fluv. Chôšab (Šamiram-Su) prope pagum Chôšab inter Wan et Baškala, in marginibus agrorum et ad vias alt. ca. 1800 m frequens. 8. IX. 1910 (No. 3477); in valle fluv. Zab prope Koçânes dit. Ğulamerik, in declivit. lapidosis alt. ca. 1500 m. 2. IX. 1910 (No. 3488).

Artemisia chamaemelifolia Vill. Taurus Armenus (Kurdistaniae distr. Hakkari): mons Harefta inter pagos Baškala et Koçânes, in decliv. lapidosis alt. ca. 2500 m. 30. VIII. 1910 (No. 3490).

Artemisia vulgaris L. Armenia Turcica: ad pagum Ćabachĕŭr inter oppida Muř et Charput, in ruderalis alt. ca. 950 *m.* 29. IX. 1910 (No. 3485).

Artemisia annua L. Armenia Turcica: in oppido Mezre (Charput), in ruderalis. 3. X. 1910 (No. 3486).

Artemisia arborescens L. (? , nondum florens). Palaestina orientalis (Ammon): ad pagum Ammân (Rabbath Ammon), ad rupes calc. alt. ca. 850 *m.* 16. IV. 1909 (No. 3484).

Artemisia Absinthium L. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter pagos Hařitha et řattak, inter frutices *Quercuum* alt. ca. 1600 *m.*, 30. VII. 1910 (No. 3478); Taurus Armenus (Kurdistaniae distr. Hakkiari): mons Harefta inter pagos Bařkala et Koĉânes, in herbidis alt. ca. 2300 *m.*, forma caulibus basi suffrutescentibus, 30. VIII. 1910 (No. 3491); in valle fluv. Zab prope pagum Koĉânes dit. Ĝulamerik, in declivit. aridis lapidosis alt. ca. 1500 *m.* 2. IX. 1910 (No. 3488).

Artemisia Haussknechtii Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ĝelo-Dar dit. Ĝulamerik, vallis torrentis Hawaspi, ad rupes alt. ca. 1600 *m.* 6. IX. 1910 (No. 3332 et 3480).

Artemisia splendens Willd. Taurus Armenus (Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari): mons Harefta inter pagos Bařkala et Koĉânes, in fissuris rupium granit. alt. ca. 2500 et 2700 *m.*, 31. VIII. 1910 (No. 3479 et 3487).

Senecio *vulgaris* L. Persia austro-occidentalis (Susiana): in ripa fluv. řaŭr ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 3524).

Senecio vernalis W. et Kit. Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Puřt-i-Kuh) supra Deilerŭn (Deh-i-Loran), 25. III. 1910 (No. 3523); Kurdistaniae Turcicae distr. řerizor: inter vicos Kân-i-Watman et Dĕr Harĭr dit. Erbil (Arbela)—Rewandŭz, in herbidis alt. ca. 800 *m.*, 21. V. 1910 (No. 3527); Armenia Turcica (Taurus Armenus): in valle fluv. Ćořab (řamiram-Su) prope pagum Ćořab, in decliv. argillosis, alt. ca. 1850 *m.*, 7. IX. 1910 (No. 3536); Armenia Turcica: ad oppidum Malatia, in agris, legit vere 1911 Fr. Anastase Cadell.

Senecio coronopifolius Desf. Arabia Petraea: Ĝebel Hârŭn (Hor) supra Wâdi Mŭsa (Petra), alt. ca. 1300 *m.* 16. VI. 1909 (No. 3953). Persia australis: Buřĭr (Abu řehr), in apricis arenosis frequens. 24. I. 1910 (No. 3531); Persia austro-occidentalis (Susiana): Banauda (Bend-i-Kĭr) inter Ahwâs et řuřtar, in ripa fluv. Âb-i-řoteit et Âb-i-Girgir frequentissimus. 8. III. 1910 (No. 4006). Mesopotamia: Babylon, in deserto, leg. Dr. Reuter (No. 3525); Ĝebel Hamrĭn inter Bařdâd et Hanikĭn, in steppa ad terram arenosam nudam, 2. V. 1910 (No. 3526).

Senecio eriospermus DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ĝĕzĭret-ibn-Ômar, in humosis alt. ca. 2300 *m.* 25. VII. 1910 (No. 3530).

Senecio racemosus (M. B.) DC. var. *latronum* Boiss. et Hausskn. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: in valle fluv. Zab prope Koçânes dit. Ğulamerik, in humosis humidis alt. ca. 1300 m. 2. IX. 1910 (No. 3535).

Senecio doriaeformis DC. var. *orientalis* Hand.-Mzt. [= *Sen. doriaeformis* var. *megalophron* Boiss. Cf. Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Authophyta aus Mesopotam. u. Kurdistan..., Annalen Naturh. Hofmus. Wien XXVII. (1913) p. 437.] Taurus Armenus: inter pagos Šattak et Gurundašt dit. Wan, ad fontes et in humosis humidis praesertim in declivit. septentrionem spectantibus alt. 1800—2000 m frequens. 31. VII. 1910 (No. 3534).

Senecio paucilobus DC. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in humosis humidis in traiectus latere septentrionali alt. ca. 1700 m. 31. VII. 1910 (No. 3522).

Calendula Palestina Boiss. Palaestina: Hierosolyma, ad terram nudam, in hortis et in ruderalis alt. ca. 750 m. 12. IV. 1909 (No. 3800). Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in vinetis alt. ca. 650 m. 10. X. 1909 (No. 3796).

Calendula Palestina Boiss. var. *brachyrhyncha* Boiss. Palaestina: Jericho, ad terram nudam, alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 3799). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâz et Šuštar, in ripa fluv. Âb-i-Šoteit frequentissima. *Achaeniorum exteriorum rostrum achaenii quartam partem vix aequans, achaenia intermedia inflata dorso echinata, intima annulata valde rugosa.* 8. III. 1910 (No. 3794).

Calendula Persica C. A. Mey. Persia austro-occidentalis (Susiana): in deserto ad ruinas Susorum, in alveolis frequentissima. 18. III. 1910 (No. 3793); Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerîn (Deh-i-Loran), 25. III. 1910 (No. 3795).

Calendula Persica C. A. Mey. var. *gracilis* (DC.) Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad ruinas Susorum, in deserto in alveolis vere subhumidis frequentissima, una cum *Calendula Persica* typ. formationes formans. 18. III. 1910 (No. 3792). Mesopotamia: in deserto ad Babylonem. 18. IV. 1910 (No. 3790 forma caulibus abbreviatis basi ramosis, No. 3791 forma umbrosa caulibus elongatis laxis parce ramosis).

Calendula Aegyptiaca Desf. var. *suberostri* Boiss. Arabia Petraea: ad oppidum Maʿân, in deserto lapidoso alt. ca. 750 m, 21. VI. 1910 (No. 3798); Moab: Wâdi ez-Zerka prope pagum Mâdaba, ad terram nudam lapidosam alt. ca. 300 m. 27. VI. 1909 (No. 3797); desertum Judaicum: ad ʿAin Ğidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -350 m, 26. V. 1909 (No. 3801), inter ʿAin Ğidi et oppidum Hebron, in lapidosis aridissimis alt. ca. 450 m. 27. V. 1909 (No. 3802).

Tripteris Vaillantii Dec. Arabia Petraea: Wâdi Mûsa (Petra),

in rupibus arenaceis ad Ed-Dêr, 19. VI. 1909 (No. 3970); Ğebel Hârûn (Hor) supra petram, alt. ca. 1050 *m.* 16. VI. 1909 (No. 3968).

Dipterocome pusilla Fisch. et Mey. Persia austro-occidentalis (Susiana): Kuh Bejjât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem, ad terram nudam sabulosam. 27. III. 1910 (No. 3854).

Gundelia Tournefortii L. In Judaea in steppis et in agris sterilibus frequens. Ad Deir Abân dit. Hierosolymae alt. ca. 550 *m.* 6. IV. 1909 (No. 3712). Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter Šuštâr et Dizfûl ad pagum Kaunak (Kônak), 12. III. 1910 (No. 3711). Kurdistania Turcica, Mesopotamiae contermina, in steppis inter Hanikîn. Kerkuk, Erbil (Arbela) et Môşul; Ğebel et Târ (Tur Abdin): frequens in agris sterilibus.

Echinops spinosus L. Palaestina: in steppis Judaicis sat frequens. Ad Bittîr dit. Hierosolymae, alt. ca. 600 *m.* 3. VI. 1909 (No. 3653).

Echinops viscosus DC. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel ad septentr. ab oppido Môşul, in rupestribus alt. ca. 800 *m.* 27. VI. 1910 (No. 3654).

Echinops Tournefortii Ledeb. Taurus Armenus: mons Harefta supra vicum Baraspi, inter Baškala et Kočânes, in herbidis alt. ca. 2600 *m.* 1. IX. 1910 (No. 3651); Kurdistaniae distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, infra tentoria aestiva „Djezra“, in humosis alt. ca. 2300 *m.* 4. IX. 1910 (No. 3652).

Adsunt huius spec. formae duo: una ex montibus Ğelo (No. 3652) *foliis etiam summis 8—10 cm longis et 4—5 cm latis, in lobos utrimque 4—5 ovato-lanceolatos, quorum maiores iterum lobulis 1—2 aucti sunt, rhachidem ca. 1 cm latam longitudine superantes, runcinnato-incisis, in toto margine angustissime reflexo spinulis longioribus patulis et brevioribus reflexis fere regulariter alternantibus obsitis, lobis spinis validis, pungentibus, 6—10 mm longis terminatis. Foliis inferioribus 20 cm longitudine superantibus, usque 10 cm latis, ambitu oblongis, in lobos lanceolatos runcinnato-incisis, lobis iterum lobulatis, rhachide angustata, ad basin angustissima, auriculis rotundatis, spinosis, caules amplexantibus.*

Forma altera ex monte Harefta (No. 3651) differt *foliis summis indivisis ovatis, 6—10 cm longis et 3—5 cm latis, basi rotundata aut subcordata caules amplexantibus, margine runcinnato-dentatis, dentibus cum spina terminali laminae latitudinis tertiam aut quartam partem attingentibus.*

Ceterum caules ca. 1.2 *m* alti, ramosi, albo-tomentosi, folia pagina superiore parce griseo-tomentosa, pagina inferiore tomento densissimo candida; capitula usque 10 *cm* diametro superantia globosa, penicillum setis copiosis longe ciliato-pinnatis involucri cylindrici ca. 3 *cm* longi dimidium vix attingens, phyllorum ca. 17 subpatule erectorum extima anguste linearia apice minute triangulari-spathulata mucronulata setoso-ciliata, basi longe ciliato-pinnata, ca. 13 *mm* longa flavido-brunnea, inter-

media basi longissime cuneato-attenuata, apice cochleato-spathulata in mucronem flavum apice subcoeruleum acutissimum non pungentem sensim attenuata basi nuda apice setoso-ciliata, sensim accreta, 17—20 mm longa, intima a basi usque ad medium perlucida basi brevissime (2—3 mm) connata lineari-lanceolata, sursum non dilatata a medio ad apicem fimbriato-lacera acuta mucrone flaccido non pungenti vix 3 mm longo terminata, flavida.

Corolla pallide caerulea, involucrum longe superans, 2—2.5 cm longa, tubo 8—9 mm longo glabro, limbo usque ad basin in lacinias patulas lineari-lanceolatas fisso.

Achaenia nondum matura adpresse flavo-hirsuta ca. 10 mm longa et 2 mm lata, pappus cylindricus ca. 3 mm longus, setis albidis inaequilongis breviter plumosis ad tertiam partem in tubum brunneum connatis.

Receptaculum subdulce ab incolis comeditur. Planta kurdice „Pampóçhta“ vocatur.

Echinops bicolor Nábělek spec. nova. (Tab. VI, fig. 2.) *Caule humili, 40—50 cm alto, simplici, foliis patulis usque ad apicem dense obsito, firmo, recto, infra 4—5 mm crasso, quinquecostato, costis prominulis crassis obtusis, toto pilis glanduliferis crispis usque 4 mm longis flavidis dense obsito. Radix et folia radicalia ignota. Folia caulina basi auriculato-cordata, amplexicaulia, inferiora ambitu lanceolata, longe acuminata, 12—14 cm longa et 6—7 cm lata, in lobos triangulari-ovatos utrimque 6—8, patulos, iterum 2—3-lobulatos ad $\frac{1}{2}$ vel $\frac{1}{4}$ laminae incisa aut infima usque ad rhachidem anguste alatum partita, spinis rigidis tenuibus flavis, pungentibus, terminalibus usque 2 cm, apicalibus loborum ca. 1 cm longis, ceteris brevioribus horrida, pagina superiore sordide viridi densissime glanduloso-velutina, nervis et nervulis albis percursa, pagina inferiore tomento densissimo adpresso candida et praeterea parce glandulosa, ad nervos et nervulos albos prominentes in spinas exeuntes longe glanduloso-hirta. Folia superiora sensim diminuta, triangulari-lanceolata simpliciora, summa ca. 3 cm longa.*

Capitula magna, florendi tempore ca. 6—8 cm diametro tenentia, pedunculis brevibus, 2—3 cm tantum longis, densissime albo-lanatis, suffulta. Involucri communis phylla inaequalia, 4—7 mm longa, oblongo-spathulata, ad basin longe cuneata, apice irregulariter spinuloso-ciliata, marginibus lateralibus membranaceo-lacera.

Involucrum parziale fusiforme, 17—25 mm longum, 2.5—3 mm latum, post anthesin usque ad 6 mm incrassatum et obscure pentagonum, amethystinum. Penicillus pauper, paleaceus, albus, nitidus, phyllis infimis aequilongus, summis triplo brevior. Phylla ca. 20—22, adpressa, externa ca. 6—8 mm longa, lineari-filiformia, apice minute triangulari-spathulata, margine superiore prorsus pectinatim ciliato-serrata, mucrone brevissimo triangulari terminata, intus glabra, extus ad apicem cochleatam pilis glandulosis densiuscule obsita. Phylla intermedia sensim accreta, in-

leriora basi longe cuneata, linea mediana fusca percursa, ceterum albida, fateribus perlucido-scariosa, apice cochleata, in mucronem brevem triangularem, ad phylla superiora sensim elongatum et validiorem, anguste triangulari-linearem, phyllorum longitudinis dimidium attingentem, apice subulatum, pungentem, abrupte et suprema \pm sensim abeuntia, summa 20—25 mm longa et 4—5 mm lata, parte inferiore extus et intus albida, glabra, nitidula, marginibus lateralibus membranacea, perlucida, parte superiore extus amethystina, glabra, aut parcissime glandulosa, intus margine et apice amethystina excepta viridia, in parte constricta infra parce sursum densissime albo-hirsuta, sericea, in margine partis superioris constrictae usque ad mucronem prorsus ciliato-serrata. Phylla intima ca. 18—22 mm longa, glaberrima, ultra medium in tubum papyraceum, albidum, nitidum, fissilem, connata, in parte libera linearia, albida, apice retusa, fimbriata. Corolla viva coerulea, 20—25 mm longa, tubo 8—12 mm longo, limbo fere ad basin in lobos lineares apice reflexos fisso. Achaenium immaturum ca. 12 mm longum, pilis setosis adpressis flavis basi brevioribus sursum longioribus dense obsitum, tenuiter 5-costatum, pappo pilis achaenii summis densissimis superato, in coronulam ca. 1 mm altam, intus auream, basi tantum fuscam, extus flavidam, margine fimbriatam, connato, coronatum.

Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in rupestribus calc. aridis alt. ca. 900 m. 12. VII. 1910 (No. 3650).

Xeranthemum squarrosum Boiss. Capitula 30—60-flora, involucri phylla externa subsquarrosa, alba, non maculata (var. unicolor Boiss.) intima intense rosea erecto-patula, elliptico-linearia, acuta, brevissime mucronulata, exterioribus ca. triplo longiora, antherarum caudae fimbriatae, pappi paleae valde inaequales: duo brevissimae triangulares sensim attenuato-subulatae ca. 2 mm longae achaenio ca. 4 mm longo ca. dimidio breviores, una longissima 5 mm longa e basi triangulari subabrupte in setam tenuissimam constricta. Kurdistania Turcica: ad pagum Maltai ad septentriones ab oppido Môsul, in declivit. lapidosis aridis alt. ca. 450 m, 5. VI. 1910 (No. 3977); ad rupes circa pagum Mâr Jakub eiusdem ditionis, alt. ca. 700 m, 10. VI. 1910 (No. 3976); distr. Hakkiari (Taurus Armenus): in valle fluv. Howarâş prope pagum Başkala inter Wan et Koçânes, ad terram nudam alt. ca. 1900 m copiosissimum [formae ramosae capitulis mediocribus 30—50-floris et formae nanae simplices uniflorae capitulis cylindricis \pm 20-floris intermixtae]. 1. IX. 1910 (No. 3978).

Chardinia Orientalis (Mill.) O. Ktze [= Ch. xeranthemoides Desf.]. Arabia Petraea: ad pagum Elği (Wâdi Mûsa), in lapidosis aridissimis. 19. VI. 1909 (No. 3925). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), 25. III. 1910 (No. 3930). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn, in graminosis alt. ca. 1000 et 1500 m. 5. V. 1910 (No. 3931 et 3932). Kurdistana-

niae Turcicae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiĝik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 650 *m*, 20. V. 1910 (No. 3929); Hadrian-Dar supra Rewandûz, alt. 1000—1500 *m*, 23. V. 1910 (No. 3924, 3927, 3928, 3933). Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3926).

Siebera *pungens* (Lam.) Gay. Kurdistania Turcica: infra pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, in steppis alt. ca. 450 *m*. 27. VI. 1910 (No. 3980). Ğebel et-Tur (Tur Abdîn): colles ad oppidum Midiat, in steppis alt. ca. 1000 *m*. 10. VII. 1910 (No. 3979).

Carlina *corymbosa* L. Palaestina: in steppis dit. Hierosolymae, forma typica var. *involucratae* Boiss. minus frequens. Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, alt. ca. 700 *m*, 18. VII. 1909 (No. 3720); in steppis moabiticis et Arabiae Petraeae sat frequens. Wâdi ez-Zerka (Moab) dit. Mâdaba, alt. ca. 600 *m*. 28. VI. 1909 (No. 3721).

Carlina corymbosa L. var. *involucrata* Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, alt. ca. 700 *m*, 18. VII. 1909 (No. 3720 *a*); 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, alt. ca. 400 *m*, 18. V. 1909 (No. 3724); Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -200 *m*. 30. III. 1909 (No. 3723).

Carlina oligocephala Boiss. et Ky. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad radices montium Halakur ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in herbis alt. ca. 1500 *m*. 25. VIII. 1910 (No. 3722).

Atractylis *cancellata* L. Judaea: in deserto inter 'Ain Ğidi (Engaddi) et Hebron, alt. ca. 300 *m*, forma *nana subacaulis* 4—7-*cephala capitulis brevissime pedunculatis*. 27. V. 1909 (No. 3725); Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -250 *m*, forma *monocephala caulibus* 3—6 *cm altis*. 30. III. 1909 (No. 3725 *a*). Kurdistania Turcica: Ğebel Hamrîn inter Bařdâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 *m*. 2. V. 1910 (No. 3725 *b*). Kurdistania Persica: Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 400 *m*. 7. V. 1910 (No. 3725 *c*).

Atractylis serratuloides Lieb. (Forma *humilis*, *caespitosa*). Moab: Wâdi ez-Zerka dit. Mâdaba, ad rupes calcar. aridissimas alt. ca. 400 *m*. 27. VI. 1909 (No. 3729).

Atractylis comosa Sieb. Judaea: El Kubebe dit. Hierosolymae, in steppis frequens. 26. VII. 1909 (No. 3726). Libanon: in saxosis ad pagum Brumâna supra Beirût, alt. ca. 700 *m*. 16. X. 1909 (No. 3727, 3728 forma simplex *monocephala*).

Arctium *minus* (Hill.) Bernh. Armenia Turcica: Wan, in ruderalis. 10. IX. 1910 (No. 3719).

Cousiniarum species determinavit cl. J. Bornmüller [Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. III. Mitteilung über weitere neue Funde. Österr. botan. Zeitschrift, Jahrg. 1913 No. 2].

Cousinia Boissieri Buhse. Flosculi vivi pallide rosei. Armenia Turcica: in declivitatibus supra fluv. Chôşab (= Šamiram-Su)

inter pagum Gurundašt et Wan, in steppa alt. ca. 1800 m. 1. VIII. 1910 (No. 3906).

Cousinia stenocephala Boiss. [Iter Turcico-Persicum I, Tab. XV.] Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis lapidosis inter pagos Maltai et Tell Kef (Tell-is-Kof) ad septentr. ab oppido Mōsul, alt. ca. 350 m. 6. VI. 1910 (No. 3907); in agris sterilibus inter Altun-Köprü et Erbil (Arbela), alt. ca. 300 m, copiosa. 18. V. 1910 (No. 3908).

Cousinia Nábělekii Bornm. (L. c. p. 59, Tab. fig. 5—6.) Sectio Drepanophorae C. Winkl. *Perennis* (?), *araneoso-tomentosa*, *caulibus* 1—1.5-pedalibus (c. 40 cm altis), *rectis, strictis, tenuiter araneoso-floccosis, apice tantum divaricatum pauciramosis, oligocephalis (capitulis 5—6), a basi ad apicem densiuscule foliatis: foliis (radicalibus desideratis) caulinis coriaceis, utrimque (subtus densius) araneosis, supra saepius glabratis, ambitu lineari-lanceolatis (inferioribus 7—9 cm longis et 2—3 cm latis, superioribus minoribus, sed conformibus), omnibus pinnatisectis vel in segmenta lineari-lanceolata integra plerumque ad basin utrimque (interdum supra medium quoque) lobo aucta partitis (rhachide spinigera anguste lineari), sessilibus et in alam sat longam (1—2 cm long.) profunde et anguste pinnatisectam decurrentibus; foliis rameis diminutis, sessilibus, non decurrentibus, spinoso-lobulatis, summis a capitulo solitario terminali paulo remotiusculis et eo brevioribus; capitulis late ovatis, 2 cm longis, ca. 40 (38!)-floris, ad basin truncatis; involucri squarrosi (phyllis intimis exceptis 16 mm alti) phyllis numerosissimis (90—100) arachnoideo-intertextis, coriaceis, margine (sub lente) tenuissime serrulatis: phyllis intermediis in subulam tenuissimam amoene hamato-recurvatam elongatis, parte recurra glabriuscula (apice flavida) quam phylli pars inferior adpressa multo brevior; phyllis intimis subrectis, stramineis, apice lanceolatis, flosculos subaequantibus; receptaculi setis laevissimis; flosculis luteis 12—14 mm longis, limbo breviter 5-dentato quam tubus 4-plo brevior; tubo antherarum glabro; achaeniis tetragonis, subcompressis; pappo 1 mm longo, scaberrimo. Kurdice „Kewarta“ vocatur.*

Armenia Turcica (Kurdistaniae Turc. distr. Hakkiari): in valle fluv. Zab prope pagum Kočānes dit. Ğulamerik, alt. ca. 1300 m. 1. IX. 1910 (No. 3902).

Cousinia moabitica Bornm. et Nábělek. (L. c. p. 60, Tab. fig. 4.) Sectio Heteracanthae Winkl. *Perennis, araneoso-virescens, densissime intricato-dumulosa; caule humili (ca. 20—25 cm alto) a basi subdichotome ramosissimo, subglabro; foliis (basilaribus desideratis) caulinis coriaceis, rigidis, reticulato-venosis, supra flavido-virescentibus glabrisque, subtus tenuiter subaraneose cano-tomentosis, inferioribus oblongo-lanceolatis (4—6 cm longis, 2 usque 2.5 cm latis) utrimque 2—4-sinuato-lobatis, lobis triangulari-lanceolatis (praesertim terminali) in spinam validam elongatam vulnerantem exeuntibus; foliis superioribus quam inferiora minoribus angustioribusque, summis capitula aggregata superantibus, omnibus sessi-*

libus breviterque cuneatim decurrentibus; capitulis ad apicem ramulorum inter bracteas angustas sublineares vel spinoso-incisas subaequilongas condensatis, parvis, subquinquefloris, oblongo-cylindricis, basin versus breviter angustatis; involucri (10—12 mm longo et phyllorum parte patente non inclusa 3—4 mm lato) glabro, pallide viridi; phyllis ca. 25, exterioribus et mediis lineari-lanceolatis, in spinam erecto-patentem vel patulam parte inferiore adpressa breviorē attenuatis, phyllis externis ad interna linearia (10) rectiuscula straminea margine (sub lente) minute tenuiter serrulata gradatim elongatis; receptaculi setis (9 mm longis) laevissimis; flosculis purpureis (10 mm longis) breviter exsertis, limbo 5-dentato quam tubo (corollinus) 3-plo longiore; antherarum tubo purpureo, glabro; achaeniis (3 mm longis), costatis, apice denticulatis, pappo caducissimo.

Palaestina orientalis (transjordanica), Moab: in lapidosis aridis prope Rabba (Rabbath Moab) inter Mādaba et El-Kerak, alt. ca. 900 m. 25. VI. 1909 (No. 3909).

Cousinia Baueri Bornm. et Nábělek (L. c. p. 61, Tab. fig. 1—3.) Sect. Appendiculatae Winkl. Perennis, rhizomate lignoso; caule recto (speciminis unici), pedali, infra medium in ramos 3—4 subfurcatim abeunte, oligocephalo (ramis longis monocephalis), a basi fere ad capitula usque foliis diminutis longe decurrentibus continue multifariam alato; foliis radicalibus subherbaceis, supra glabris parcissime tantum araneis tenuiterque reticulato-cenosis flavido-virentibus, subtus vero indumento albido tenui tomentoso tectis, ambitu oblongis (maioribus 11×4.5 cm longis latis), lyratis; segmento terminali permagno 8 cm usque longo, oblongo, cordato, apice acuto, margine tenuiter et minute sinuatim spinuloso-dentato; iugis lateralibus 3—4 densis, oblongo-lanceolatis (ca. 2 cm longis), deorsum curvatis, ad basin (uti ad folii rhachidem) lobulis spinoso-laciniatis auctis; foliis caulinis infimis parvis sed radicalibus subconformibus, ceteris ad basin ramorum sitis (ovatis) et praesertim rameis valde diminutis (quam alae vix latioribus), coriaceis, subtus canis vel albidis, supra glabris, continue alari-decurrentibus, alis ramo subaequilatis vel eo paulo latioribus, undique sinuato-dentatis spinulisque armatis; capitulo terminali, maiusculo, depresso-globo, ad basin umbilicato, cum phyllorum appendicibus 5 cm latis (appendicibus exclusis 3 cm), multifloris; involucri phyllis intermediis e basi adpressa coriacea pallida gradatim elongatis in appendicem latam rhombeo-lanceolatam (lobis appendicis lateralibus triangularibus, non deorsum curvatis) 15—18 mm longam patentem margine hinc inde spinula tenui auctam plerumque purpureo-tinctam glabram productis; phyllorum exteriorum appendice oblongo-lanceolata reflexa utrimque irregulariter dentibus 1—2 angustis armata; phyllorum intimorum stramineorum nitidorum appendice recta, purpurea, angustato-lanceolata, inermi, margine minute sed obsolete serrulata; receptaculi setis laevissimis vel sublevis, sub lente sparsim dentes tenues sursum adpressos gerentibus, 17 mm usque longis; flosculis purpureis, 25—30 mm longis, exsertis, limbo

ad quintam partem dentato quam tubus subaequilongus; antherarum tubo glaberrimo, purpureo; achaeniis nondum maturis apice obscure denticulatis; pappo scabridulo, 6—7 mm longo.

Kurdistania Turcica (Assyria): in derelictis horti coenobii in pago Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môsul, alt. ca. 1000 m. 7. VI. 1910 (No. 3903).

Cousinia aintabensis Boiss. et Hausskn. [L. c. pag. 62.] Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Mirgamira prope pagum Šarnach (Šernach), ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, alt. ca. 1350 m. 24. VII. 1910 (No. 3905).

Cousinia eriocephala Boiss. et Hausskn. [L. c. p. 63.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: traiectus inter pagos Hoz et Chômar dit. Šattak, in declivitatibus septentrionalibus in vallem fluv. Bochtan spectantibus, alt. ca. 2500 m. 30. VII. 1910 (No. 3904).

Carduus adpressus C. A. Mey. Armenia Turcica: in agris et ad vias in valle fluv. Chôšab (Šamiram-Su) prope pagum Chôšab dit. Wan, alt. ca. 1800 m. 7. IX. 1910 (No. 3553). In agris ad pagum Baškala dit. Wan, alt. ca. 1600 m.

Carduus pycnocephalus Jacq. Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 3555). Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3557).

Cirsii species determinavit cl. F. Petrak.

Cirsium congestum F. et Mey. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: in valle torrentis Âv Kočânes prope pagum Kočânes dit. Ğulamerik, ad rivulum alt. ca. 1400 m. 6. IX. 1910 (No. 3540); in valle torrentis Hawaspi in montibus Ğelo dit. Ğulamerik, in lapidosis humidis alt. ca. 1350 m. 6. IX. 1910 (No. 3539).

Cirsium lappaceum MB. ssp. *anatolicum* Petr. *Foliorum forma Cirsio lappaceo* MB. ssp. *culappaceum* var. *ferox* Boiss. typico proximum, a quo tamen differt capitulis minoribus non congestis, in foliorum supremorum axillis subsessilibus, brevissime sed tamen manifeste pedunculatis, quibus notis var. *microcephalum* Boiss. accedit, a quo autem capitulis multo maioribus differt. (Petrak.)

Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in herbidis subhumidis ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 3547).

Cirsium macrobotrys (C. Koch) Boiss. Taurus Armenus: traiectus Ćûk, inter pagos Chôšab et Baškala dit. Wan, ad rivulos usque ad alt. ca. 1900 m; mons Harefta inter pagos Baškala et Kočâ es dit. Ğulamerik, alt. ca. 2000 m. 31. VIII. 1910 (No. 3542).

Cirsium bracteosum DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in lapidosis humidis alt. ca. 2000 m. 26. VII. 1910 (No. 3546).

Cirsium aduncum F. et Mey. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Mirgamira prope pagum Šarnach (Šernach) ad septentr.

ab oppido Ġezîret-ibn-Ômar, in herbidis inter frutices *Quercuum* alt. ca. 1500 *m.* 24. VII. 1910 (No. 3551).

Cirsium Haussknechtii Boiss. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes dit. Ġulamerik, in humidis alt. ca. 2000 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3550).

Cirsium esculentum (Siev.) C. A. Mey. Ssp. *caucasicum* C. A. Mey. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in pascuis subhumidis ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3548).

Cirsium simplex C. A. Mey. Ssp. *armenum* DC. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes dit. Ġulamerik, in pascuis alpinis ad nives tabescentes alt. ca. 2800 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3541).

Cirsium pubigerum DC. Taurus Armenus: traiectus Ćûk inter pagos Chôšab et Baškala dit. Wan, ad rivulum alt. ca. 2200 *m.* 8. IX. 1910 (No. 3543).

Cirsium Libanoticum DC. (*Cirsium apiculatum* DC., cf. Handel-Mazzetti, Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopot. . . p. 444). Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, in agris inter segetes alt. ca. 750 *m.* 19. VII. 1910 (No. 3549).

Cirsium (*Pienomon*) *Acarna* (L.) Mneh. Judaea: in steppis circa Hierosolyma; El-Kubebe dit. Hierosolymae, alt. ca. 700 *m.* 26. VII. 1909 (No. 3545). Armenia Turcica: ad pagum Chošmat dit. Charput, in agris sterilibus alt. ca. 1100 *m.* frequens. 1. X. 1910 (No. 3544).

Cirsium arvense (L.) Scop. Ssp. *incanum* Fisch. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, inter segetes alt. ca. 750 *m.* 19. VII. 1910 (No. 3537). Taurus Armenus: ad pagum Gurûndašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 *m.* 1. VIII. 1910 (Nr. 3538).

Notobasis *syriaca* (L.) Cass. = *Cirsium syriacum* (L.) Gaertn. Gallilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 *m.* 24. IV. 1909 (No. 3644). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Gök-Tepe inter Erbil (Arbela) et Altun-Köprü, ad fossam irrigationis alt. ca. 260 *m.* 17. V. 1910 (No. 3643).

Silybum *Marianum* (L.) Gärtn. Gallilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3648). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum, 18. III. 1910 folia saltem radicalia (No. 3645). Mesopotamia: ad fossas irrigationis in ruinis Babylonis. 18. IV. 1910 (No. 3646 et 3647).

Cynara *Kurdica* Hand.-Mzt. [Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam. . . p. 445.] (Tab. XII., fig. 5. et pag. 19, fig. 19—20.) Descriptio amplificata: *Achaenia ovato-oblonga, subincurva, basi attenuata, a lateribus subcompressa, vix tetragona, nitidula, grisea, brunneo-marmorata, ca. 8 mm*

longa et 3.5 mm lata; pappi setae longiores 4.5 cm longae. Phylla intima demum usque 6 cm longa, a basi ad 4 cm linearia, 1 cm lata, extus brunnea, in margine pallidiora, papillis deterrentibus pulverulenta, intus albida, nitidissima. Supra 4 cm in appendicem chartaceam, spatulatam, subundulatam, pallide brunneo-purpuream, in margine parum lacerosam, brevissime mucronatam, parte basali vix latiore ca. 2 cm longam, sensim dilatata. Armenia Turcica: ad pagum Karašêch dit. Mezere (Charput), in agris alt. ca. 1200 m. 1. X. 1910 (No. 3649).

Onopordon tauricum Willd. subsp. *corymbosum* Willd. [Rouy: Revision du genre Onopordon, p. 590.] Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis inter pagos Maltai et Tell Kef ad septentr. ab oppido Môşul, alt. ca. 350 m. 6. VI. 1910 (No. 3561).

Onopordon Illyricum L. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis ad pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, alt. ca. 500 m. 7. VI. 1910 (No. 3560).

Onopordon Sibthorpianum Boiss. et Heldr. var. *Alexandrinum* Boiss. Palaestina: 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -250 m. 31. III. 1909 (No. 3559).

Onopordon Sibthorpianum Boiss. et Heldr. var. *Anatolicum* Boiss. Tur Abdin (Ğebel et-Tur): ad oppidum Midiat, in agris alt. ca. 1000 m. 10. VII. 1910 (No. 3562).

Onopordon heteracanthum C. A. Mey. Palaestina orientalis, (Moab): in steppis ad Rabba (Rabbath Moab) inter Mâdaba et el-Kerak, alt. ca. 900 m. 13. VI. 1909 (No. 3558).

Onopordon candidum Nábělek sp. nova. (Tab. VI, fig. 1.) *Biennis, undique dense arachnoideo-tomentosum niveum. Radix perpendicularis, simplex, longa, ad collum ca. 4 mm crassa, atro-fusca. Caulis simplex, monocephalus, rectus, 18—30 cm altus, sub tomento denso niveo obscure angulatus, basin patentim sursum adpresse decurrenti-foliatus, apice foliis reductis fere nudus, angustissime alis spinulosis alatus. Folia pagina superiore dense arachnoidea, inferiore densissime arachnoideo-tomentosa, nirea, radicalia florendi tempore iam erantida, caulina infima patula, oblonga, acuta, grosse lobato-dentata lobis utrimque 4—5, spinis usque 4 mm longis, tenuibus, subulatis, pungentibus, flavis terminatis, ceterum in margine spinulis minoribus praedita, basi in petiolum attenuata, ca. 5—7 cm longa et 2—3 cm lata, superiora sensim diminuta, sessilia, alis spinigeris continue decurrentia, ab inferioribus erecto-patulis in summa, cauli adpressa, minima, triangulari-lanceolata, acuta, spina terminata, vix 1 cm longa et 5 mm lata, alis spinigeris angustissimis decurrentia, transeuntia.*

Capitula ovato-cylindrica, basi angustata, 3.5—4.5 cm longa et 2—2.5 cm lata. Involueri phylla floccose niveo-arancosa, apice violacea, omnia adpressa, acuta, spinula flava, subulata, subpungenti, recta, terminata, infima triangulari-lanceolata, ca. 8 mm longa et 2—3 mm lata,

superiora sensim elongata, lanceolato-linearia, intima linearia, longe acuminata, acutissima, in spinulam vix pungentem sensim attenuata, basi et pagina interiore tota straminea, glaberrima, nitidula, pagina exteriori a medio violacea, scabrida et glandulifera, in margine scabra, minutissime denticulato-ciliatula, 25—30 mm longa et 1.5—2 mm lata, flosculos non aequantia.

Flosculi suaveolentes, cum stigmatē corollae limbum superante ca. 34 mm longi. Corollae violacco-roseae, glabrae, ca. 31 mm longae, tubus ca. 16 mm longus, limbus in lobos lineares, acutos, brevissime mucronatos, ca. 12 mm longos, ad $\frac{3}{4}$ longitudinis suae fissus. Antherae ca. 11 mm longae, appendice ca. 1 mm longa terminatae. Stigma simplex, tenuiter cylindricum, ca. 5 mm longum, demum ex antherarum tubo totum exsertum. Pappi setae breviter plumosae, inaequales, una longissima quam ceterae validiore sub anthesi 14 mm longitudine attingente, basi in anulum aureum connatae. Achaenium florendi tempore subfuscum, lere, nitidum, pluristriatum, maturum ignotum.

Indumento *Onopordon polycephalum* Boiss. refert, sed monocephalum, capitulis cylindricis etc. omnino dissimile.

Habitat in Armenia Turcica in agris incultis et in lapidosis aridis ad Topra Kaleh supra oppidum Wan, alt. ca. 1850 m. Legi 17. VIII. 1910 (No. 3554).

Jurinea Staehelinae (DC.) Boiss. Arabia Petraea: Ġebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), in fissuris rupium arenacearum alt. ca. 1200 m. 19. VI. 1900 (No. 3677).

Jurinea pulchella DC. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in valle torrentis Âv Koçânes infra pagum Koçânes dit. Ġulamerik, ad rupes alt. ca. 1400 m. 5. IX. 1910 (No. 3923).

Jurinea carduiformis (Jaub. et Sp.) Boiss. Kurdistania Persica: inter Kasr-i-Šîrîn et Sar-i-Pûl, in declivitatibus aridissimis arenosis alt. ca. 600 m. 4. V. 1910 (No. 3564). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Kân-i-Watman dit. Erbil (Arbela) — Rewandûz, ad colles in declivitatibus aridissimis alt. ca. 800 m. 25. V. 1910 (No. 3563).

Jurinea macrocephala DC. Armenia Turcica: ad oppidum Mar'as (No. 3922).

Jurinea Cataonica Boiss. et Hausskn. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Auwal in valle Bekât ad orientem ab oppido Š'ert, in saxosis alt. ca. 900 m. 20. VII. 1910 (No. 3910).

Jurinea depressa (Stev.) C. A. Mey. var. *pinnatisecta* Boiss. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Koçânes dit. Ġulamerik, in pascuis alpinis humidis alt. ca. 2800 m. 31. VIII. 1910 (No. 3974).

Serratula cerinthefolia Sibth. et Sm. Judaea: ad pagum El-Kubebe dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 650 m. 26. VII. 1909

(No. 3811). *Kurdistania Turcica* (Assyria): ad pagum Maltai ad septentr. ab oppido Môşul, ad rupes alt. ca. 400 *m.* 6. VI. 1910 (No. 3812).

Serratula coriacea Fisch. et Mey. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkari: in valle fluv. Zab prope pagum Koçânes dit. Ğulamerik, in lapidosis alt. ca. 1300 *m.* 5. IX. 1910 (No. 3919).

Serratula radiata M. B. *Taurus Armenus*: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in herbidis subhumidis alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3920).

Serratula oligocephala DC. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Berwari: mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Haşitha, in agris et inter frutices *Quercuum* alt. 1400—1500 *m.* 16. VI. 1910 (No. 3663 et 3921).

Rhaponticum pusillum (Labill.) Boiss. (= *Rhaponticum pygmaeum* DC. = *Centaurea pygmaea* Benth. et H.) *Arabia Petraea*: Wâdi et Tawahîn inter El-Keral et Et-Tafîle, 17. VI. 1909 (No. 3975); El-Bêda prope castellum Şôbak, 18. VI. 1909 (No. 3973).

Phaeopappus salignus (C. Koch) Boiss. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkari: mons Bestabije prope pagum Hoz inter pagos Haşitha et Şattak, in herbidis alt. ca. 1650 *m.* 27. VII. 1910 (No. 3681).

Phaeopappus Aucheri (DC.) Boiss. var. *Szovitzii* Boiss. forma *dissecta* m. (Tab. VII, fig. 2.) [Cf. Bornmüller: *Plantae Straussianae*, Beih. Botan. Zentralbl. XX. 2, p. 165.] *Caule humili, 14—22 cm alto, simplici, basi foliorum vetustorum petiolis basi vaginanter dilatatis, infimis in fibras solutis, vestito, foliis omnibus divisis, inferioribus longe petiolatis, in lacinias numerosas, late ovato-lanceolatas, acutas, mucronulatas, basi lacinula unilaterali ovato-lanceolata, unica, aut secunda minori in eodem flatere altius posita, auctas, pinnatisectis, rhachide anguste alata, lobulos breves gerente. Foliis superioribus sessilibus, segmentis infimis secus rhachidem late decurrentibus, caulem amplexantibus et paulum decurrentibus, summis diminutis, capitulo approximatis, eo duplo brevioribus, ovato-lanceolatis, in lacinias breves lanceolato-ovatas, mucronatas, utrimque 1—2, pinnatipartitis. Capitulis ca. 4 cm longis et 2.5 cm latis, phyllorum intermediorum appendicibus eis subduplo brevioribus, ovato-triangularibus, totis scariosis, margine non tenera, albida, pallide flavis aut fuscis, fimbriis utrimque 5, appendicis latitudinem superantibus, ornatis, spina tenui, subpungenti, ca. 4 mm longa, appendicis longitudinem aequante, terminatis. Phylla infima in bracteis plerumque 2, simplices, triangulares, longe acuminatas, subherbaceas, transeuntia.*

Corollae usque 3 cm longae limbus ca. 15 mm longus, stramineus, lineis 5 purpureis, tenuibus, ornatus. Pappi setae ca. 1.5 cm longae, basi solum flavae, ceterum sordide violaceae, barbellatae, nitidae. Achaeonium immaturum pallide brunneum, opacum, teretiusculum, tenuissime striatum.

Forma haec, inter varietatis *Szovitzii* Boiss. formas distincta et forsân varietatem propriam formans, differt caulibus humilibus, foliis

omnibus partitis, laciniis late ovato-lanceolatis nec anguste oblongo- vel lineari-lanceolatis, capitulis magnis. Huc etiam specim. quaedam Kotschyana ex fauce Dudera m. Elbrus (Plantae Persiae bor. No. 431) spectant, dum alia specimina in eodem loco collecta et eodem No. signata varietati integrifolius Boiss. pertinent. Ceterum *Phaeopappus Aucheri* (DC.) Boiss. variabilissimus est.

Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad rupes graniticas alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 3664).

Phaeopappus leuzeoides Boiss. var. *Szovitsii* Boiss. Specim. Straussianis in „Khouzar in m. Kuh Domine (Teradûn)“ lectis simillimus, sed differt *phyllorum appendicibus totis scariosis nec margine teneribus albidis*. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Siars supra pagum Hašitha, in humosis alt. ca. 1750 m. 19. VI. 1910 (No. 3661).

Phaeopappus scoparius (Sieb.) Boiss. (= *Centaurea scoparia* Sieb.) Arabia Petraea: ad oppidum Maʿân, in deserto lapidoso, 20. VI. 1909 (No. 3692).

Amberboa crupinoides (Desf.) DC. Palaestina: Wâdi el-Kelt prope Jericho, in declivitat. aridis alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 3817 et 3819).

Centaurea depressa M. B. *Taurus Armenus*: ad pagum Chôšab dit. Wan, inter segetes alt. ca. 1800 m frequens. 7. IX. 1910 (No. 3706); Armenia Turcica: ad oppidum Malatia vere 1911 leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3673).

Centaurea cyanoides Berggr. et Wahlenb. Judaea: ad pagum Abu Rôš dit. Jerusalem, in margine agrorum alt. ca. 500 m. 2. IV. 1909 (No. 3679).

Centaurea cana Sibth. et Sm. (= *Centaurea axillaris* Willd. var. *cana* Boiss.) Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: traiectus inter pagos Aradên et ʿAin Nûne (inter Amadia et Hašitha), in latere septentrionali alt. ca. 1500 m. 15. VI. 1910 (No. 3684); districtus Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha, alt. ca. 2100 m. 20. VI. 1910 (No. 3676); mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, inter frutices Astragalorum alt. ca. 2650 m. 28. VII. 1910 (No. 3685).

Centaurea Ammocyanus Boiss. Arabia Petraea: in steppa in desertum transeunte inter Elġi (Wâdi Mûsa, Petra) et Maʿân, 20. VI. 1909 (No. 3691). Kurdistania Turcica Mesopotamiae contermina (Assyria): Ġebel Kumataš inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 250 m. 3. V. 1910 (No. 3699).

Centaurea stramenticia Hand.-Mzt. (Handel-Mazzetti: Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotamien... pag. 448.) Ġebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 m. 2. V. 1910 (No. 3698).

Centaurea virgata Lam. Armenia Turcica: ad oppidum Malatia vere 1911 leg. Fr. Anastase Cadell (No. 3672).

Centaurea virgata Lam. var. *squarrosa* (W.) Boiss. Kurdistaniae Turicae distr. Šerizor: in glare a rivi Nahr Astêre inter 'Ain Kawa et Dêr Harîr dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 400 m. 26. V. 1910 (No. 3700). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in marginibus agrorum in declivit. septentrionalibus alt. ca. 1850 m frequens. 1. VIII. 1910 (No. 3674).

Centaurea glaphyrocephala Nábělek spec. nova. (Tab. VII, fig. 1 et pag. 40, fig. 1—4.) Sect. *Acrolophus* Cass. *Perennis, e radice crassa pluricipite caules complures, ca. 40 cm altos, virgatos, infra tenuiter albo-araneosos, flavidos, pluristriatos, supra virides, breviter griseo-tomentellos, costis prominulis 4 flavidis quadrangulos, a medio aut paulum infra medium composite paniculatos, ramis divaricatis aut patulis, edens.*

Folia radicalia ignota, caulina inferiora florendi tempore evanida, etiam superiora iam sicca, sessilia, simplicia, anguste linearia, obtusiuscula, parce tomentella, uninervia, nervo vix prominulo, minute et crebre punctulata, inferiora ca. 3 cm longa et 3 mm lata, superiora diminuta. Folia ramealia caulinis similia, sed diminuta, summa, capitula fulcrantia, 2—3 mm longa.

Capitula caduca, ad apices ramorum plerumque 2—3, rarius 4 aggregata aut etiam solitaria, brevissime pedunculata aut sessilia, foliis summis minimis suffulta. Involucrum anguste oratum, partibus patulis exceptis ca. 1 cm longum et 3 mm latum. Involucri phylla pagina exteriori pruinosa, intus nitentia, ab infimis minimis triangulari-lanceolatis (cum mucrone ca. 3 mm longis et 0.75 mm latis) ad media lineari-lanceolata, longe acuminata, (usque 7 mm longa et 1 mm lata) sensim aucta, pallidissime flavescentia, trinervia, hyalino-marginata, squarrosa, apice arcuatim reflexa, infima a $\frac{1}{3}$, media a $\frac{1}{2}$, inferiora a $\frac{2}{3}$ pectinatim et patule albo-ciliatis ciliis scabridis tenuissimis usque 2.5 mm longis utrimque 6 (rarius 7) in mucronem ciliis non validiorem et fere aequilongum recurvum sensim abeuntia. Phylla intima anguste lineari-lanceolata, trinervia, a medio pallide violacea, latiuscule hyalino-membranacea, mucrone tenuissimo ca. 2 mm longo recto aut erecto-patulo terminata, apice vix lacerata, ca. 10 mm longa. Paleae setaceae ca. 6 mm longae.

Flosculi rosei 5—6, rarius 7, non radiantes. Corollae glabrae ca. 11 mm longae, tubus ca. 4 mm, limbus ca. 7 mm longus, in lobos ca. 4 mm longos, acutos, patulos, fissus. Stigma totum exsertum, ca. 2 mm longum. Achaenia sub anthesi hirsuta, pappi albi setis penultimis aequilonga.

Centaureae virgatae Lam. habitu, caulibus etc. proxima esse videtur, et forsitan eius varietas, ad varietatem squarrosam Boiss. accedens, sed ab ea differt imprimis involucri elegantissimi phyllis pallidissime flavis, longe et tenuissime albo-ciliatis, fere plumosis, mucrone tenuissimo, ciliis simili, eis aequilongo, arcuatim recurvo, terminatis, achaeniis omnibus papposis.

Habitat in Mesopotamia septentrionali (Ğebel et-Tur, Tur Abdin) in steppis ad oppidum Midiat, ad colles substr. calcar. alt. ca. 1050 *m*, ubi sat frequens. Legi 10. VII. 1910 (No. 3666).



Fig. 6.

Centaurea glaphyrocephala. Involucri phylla.

Centaurea Damascena Boiss. Arabia Petraea: Petra (Wâdi Mûsa), ad rupes arenaceas in declivitat. montis Hor (Ğebel Hârûn), alt. ca. 1000 *m*. 19. VI. 1909 (No. 3821).

Centaurea spinulosa Rochel [= *C. Scabiosa* L. var. *spinulosa* (Rochel) Boiss.]. Cf. A. v. Hayek: *Centaurea*-Arten Österreich-Ungars. p. 35 [618]. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in saxosis alt. ca. 2000 *m*. I. VIII. 1910 (No. 3680 et 3689).

Centaurea speciosa Boiss. Palaestina orientalis: Hermon (Ğebel eš-Šêch), ad rupes calcar. in valle prope Bânias (Caesaraea Philippi), alt. ca. 800 *m*. 26. IV. 1909 (No. 3678).

Centaurea eryngioides Lam. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymae, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 400 *m*. 18. V. 1909 (No. 3694). Kurdistania Persica: ad pagum Sar-i Pâl dit. Kâsr-i-Šîrîn, ad rupes calcar. in fauce humida alt. ca. 550 *m*. 6. V. 1910 (No. 3707).

Centaurea Persica Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: in radicibus montium Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in herbidis alt. ca. 1500 *m*. 26. VII. 1910 (No. 3667).

Centaurea regia Boiss. Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Zacho (Bidaro, Azach) dit. Ğezîret-ibn-Ômar, in steppa alt. ca. 540 *m* frequens. 6. VII. 1910 (No. 3683).

Centaurea Chaldaeorum Nábëlek spec. nova. (Tab. VIII.) Sect. *Acrocentron* Boiss. Biennis, caulis ca. 50 *cm* altus, crassus, simplex, superne racemose 3—4-cephalus, subtus densius, supra parcius floccoso-arachnoideus vel tomentosus, albido multistriatus. Folia radicalia florendi tempore iam sicca ovata, acuta, integra, pilis septatis crispulis albidis ad nervos longioribus utraque facie dense obsita, tenuiter chartacea, nervis et nervulis utraque facie prominentibus percursa, in petiolum longum dense albo-tomentosum, planum, basi dilatatum, breviter attenuata, lamina ca. 18 *cm* longa et 6 *cm* lata, petiolo ca. 10 *cm* longo. Folia caulina infima in petiolum brevem alatum angustata, cetera sessilia,

lanceolata, acuminata, breviter mucronata, basi late auriculato-decurrentia, alis longis, sensim angustatis, sursum sensim diminuta, integumento et nervis radicalibus similia. Folia superiora anguste lanceolata, mucrone sensim elongato et validiore terminata, summa ad mucronem longe triangularem rectum subpungentem reducta et demum sub capitulo in phylla involueralia transeuntia.

Capitula magna, partibus patulis exceptis ca. 3 cm lata et cum flosculis fere 5 cm longa, pedunculis albido-araneosis, 3—7 cm longis, suffulta. Involueri ovati, basi truncati, phylla infima brevissima, brevissime tomentella, griseo-viridia, orbiculata, ca. 4 mm lata, appendice pallidissime flava, eis aequilata, non decurrenti, ca. 6 mm longa, triangulari, reflexa, scariosa, longe pectinatim ciliata, in spinam validam, eis aequilongam, pungentem, sensim abeunte, terminata. Phylla intermedia inferiora latissime ovata, ca. 12 mm lata et 15 mm longa, parte oblecta adpressissima straminea, ceterum pallide virescenti-grisea, firma, coriacea, intus nitida, extus opaca, basi glabra, parte libera brevissime tomentella, obscure striata, margine tenuia, in appendicem albidam, orato-cochleatam, ca. 4 mm latam et 5 mm longam, pectinatim ciliatam, ciliis utrimque 6—7, firmis, subulatis, in spinam terminalem validam, anguste triangularem, basi planam, acutam, pungentem, usque 10 mm longam, patentem, sensim transeunte, abrupte constricta. Phylla intermedia superiora sensim aucta, maxima usque 18 mm longa, appendice cum spina 22 mm longa, spina sola 15 mm attingente, terminata. Phylla interiora sensim angustata et elongata, demum ovato-lanceolata, in parte latissima hyalino-marginata, usque 22 mm longa et 8 mm lata, appendice patula, sensim diminuta, et brunnescenti, spina terminali sensim diminuta, terminata: intima lineari-lanceolata, pallidissime straminea, nitida, ca. 27 mm longa et 5 mm lata, latiuscule hyalino-marginata, longe acuminata, in appendicem parvam, angulo recto patulam, orato-cochleatam, in lateribus hyalinam et parum lacerosam, ad dorsum pallide fuscam, in spinulam flavam ca. 4 mm longam sensim abeuntem, abrupte transeuntia.

Flosculi rosei, glabri, marginales steriles, usque 5 cm longi, anguste tubulosi, limbo non dilatato in lacinias 3 anguste lineares, obtusiusculas, ca. 7 mm longas, partito. Flores ceteri fertiles, ca. 4.5 cm longi, exteriorum tubus dorsum curvatus, ca. 3 cm longus, limbus cylindricus in lobos erecto-patulos, lineares, obtusiusculos, antherarum tubum aequantes, ca. 6—7 cm longos, partitus. Filamenta papillosa. Achaenium glaberrimum, nitidum, album, subcompressum, apice angustissime acute marginatum, ca. 7 mm longum et 4 mm latum; pappi setae albae, penultimae ca. 8 mm longae, intimae vix 1 mm attingentes. Paleae ca. 12 mm longae, setaceae.

Inter sect. *Acrocentron* Boiss. ** *Cynaroideae* Boiss. dispositionis Boissierianae species *Centaureae giganteae* Sch. Bip. proxima esse videtur, cui foliis integerrimis etc. similis est, sed differt

ab ea capitulis maioribus, pedunculis longioribus, involucri spinis inter-
mediis longioribus, flosculis roseis nec lutescentibus, pappo albo nec
fuscescenti, statura multo humiliore et capitulis paucioribus. *Centaurea*
imperialis Hausskn. [Bornmüller: *Plantae Straussianae*, Beih. Bot.
Centralbl. X. X. 2. p. 167] differt praeter ceteras notas involucri phyllorum
spina brevissima; *Centaurea Cataonica* Boiss. et Hausskn. phyllis
spina terminatis praedita, differt foliis lyrato-pinnatipartitis, flosculis
atropurpureis etc.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae districtu Ramorân, ad pagum
Šernach (Šarnach) ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in steppa
inter frutices *Quercuum* alt. ca. 1200 m. Legi 24. VII. 1910 (No. 3669).

Centaurea sessilis Willd. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân:
Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in pascuis alpinis
subhumidis alt. ca. 2500 m. 26. VII. 1910 (No. 3668). Kurdistaniae Tur-
cicae distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos
Hašitha et Šattak, in pascuis alpinis alt. ca. 2600 m. 28. VII. 1910
(No. 3682).

Centaurea Balsamita Lam. Kurdistania Turcica: ad pagum
Mâr Gorîa dit. S'ert, in humosis alt. ca. 1000 m. 16. VII. 1910 (No. 3675).

Centaurea Crocodylium L. Palaestina: Ğebel Mâr Elias
(Karmel), inter rupes ad El - Muchraka, alt. ca. 500 m. 2. V. 1909
(No. 3695).

Centaurea schizophylla Nábèlek sp. nova. [Tab. IX.] Sect. *Microlo-*
phus Boiss. *Biennis*. *Ad collum petiolorum foliorum radicalium, florendi tem-*
pore emarcidorum, basibus in fibras fuscas dissolutis, vestita, tota papil-
loso-aspera, pallide viridis. Caulis 30—40 cm altus, primum albo-
tomentellus, tum glabrescens, a basi aut paulum supra divaricatim ramo-
sissimus, pallide viridis, costis albidis, obtusis multistriatus. Folia
radicalia primo anno rosulam formantes, ambitu oblongo-lanceolata, usque
30 cm longa et 26 cm lata, cartilaginea, scabrida, et praesertim ad nervos
subtus prominulos et ad rhachidis latus inferius crispule hirta, petiolata,
pinnatipartita, segmentis utrimque 8—10, magnis, et tot parvis, alter-
nantibus, lineari-lanceolatis, basi paulum dilatata rhachidi angustae, non
alatae, adnatis, repando-dentatis, maioribus plerumque ad basin aut ad
medium lobulo ceteris maiore, deorsum spectante, praeditis, infimis et
summis basi paulum confluentibus, diminutis, terminali quam cetera
non maiore. Folia caulina inferiora radicalibus similia, sensim
diminuta, petiolo supra plano, glabro, subtus crispule puberulo, basi dila-
tato, laminam dimidiam aequante, suffulta, superiora sessilia, basi sub-
cordato-auriculata, non decurrentia, ab inferioribus pinnatipartitis, lobis
sursum basi confluentibus, in superiora lanceolata usque lineari-lanceolata,
repando-dentata et demum integra, ad ramos valde diminuta, summa
lanceolato-linearia, acuta, vix 5 mm longa et 1 mm lata, sensim transeuntia.

Capitula ad ramos strictos, firmos, terminalia, solitaria. Involucri ovati, partibus patulis exceptis ca. 9 mm lati et 12 mm longi, basi brevissime angustati, phylla tomentella, coriacea, virescenti-flava, infima breviter triangularia, in spinam tenuissimam non pungentem, eis plus duplo longiorem, attenuata, intermedia cito elongata, orata et ovato-lanceolata, ca. 6 mm longa et 4 mm lata, in spinam flavam, eis fere triplo longiorem, usque 15 mm longam, basi planam, apice subulatam, erecto-patulam, pungentem, flosculos subaequantem, sensim attenuata. Phylla intima anguste lanceolata, longe acuminata, ca. 12 mm longa et 3 mm lata, hyalino-marginata, mucrone anguste triangulari, non pungenti, vix 2 mm longo, terminata. Flosculi straminei, cum stylo limbi lobos superante ca. 24 mm longi, glabri, tubo ca. 10 mm longo, limbo cylindrico in lobos ca. 3 mm longos, staminum tubum non aequantes, ad tertiam partem fissi. Achaenia immatura subcompressa, hirtella, apice brevissime marginata, pappo albo coronata. Paleae setae, argenteae, ca. 10 mm longae.

Ex affinitate proxima *Centaureae myriocephalae* Schtz. bip. habitu simili. cuius forsitan varietatem format, sed ab ea differt foliis radicalibus pinnatipartitis nec lyratis (segmento terminali magno, ovato-rhombeo vel cordato), foliis caulinis subcordato-auriculatis, non decurrentibus, involucri phyllorum spinis eis usque triplo longioribus nec eis aequilongis. Specimina Haussknechtiana ex deserto Singarae [in herbario Mus. palat. Vindobon.] *Centaureae myriocephalae* adnumerata, capitula eis specim. mearum similia praebent, sed foliis radicalibus carent. Folia caulina sunt integra. *Centaureae myriocephalae* var. *erythracanthae* Bornm. cuius involucri phylla spinis eis longioribus, purpureis, terminata sunt, folia radicalia Cent. *myriocephalae* typicae modo lyrata sunt. Specimina a cl. Dr. Handel-Mazzetti in steppis inter Sindschar et 'Ain el-Ghasal (No. 1351), Cent. *myriocephalae* adnumerata, phyllis longe spinosis et foliis caulinis repandodentatis et integris intermixtis praedita, *Centaureae schizophyllae* adnumeranda sunt. *Centauream myriocephalam* capitulis minoribus, phyllis in spinam eis solum aequilongam attenuatis, foliis radicalibus lyratis, cum descriptione Boissieriana (Flor. Orient. III. pag. 682) congruentem, in Mesopotamia bor.-orientali (Assyria) non repperi.

Crescit copiose in steppis et in agris incultis in Mesopotamia (Assyria) in planitie et ad colles inter oppida Kerkuk et Erbil (Arbela), alt. ca. 250—350 m; *Centaureae myriocephalae* modo autumnis exsiccata ventis rupta per steppas volvitur. Legi inter Kerkuk et Altunköpri 17. V. 1910 (No. 3708) et inter Altunköpri et Erbil 18. V. 1910 (No. 3670), inter Môsul et Mâr Jakub prope Tell Kef alt. ca. 400 m. 6. VI. 1910 (Nr. 3709), inter Zacho (Azach) et Ġezîret-ibn-Ômar frequens.

Centaurea Behen L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân:

vallis Bekât inter pagos Berka et Ğenet ad orientem ab oppido S'ert, in steppa inter frutices Quercuum alt. ca. 900 m. 21. VII. 1910 (No. 3705).

Centaurea Szovitsiana Boiss. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in declivitatibus humosis humidis alt. ca. 2000 m. 1. VIII. 1910 (No. 3690).

Centaurea Nĕmecii Nábĕlek spec. nova. (Tab. X.) *Biennis, elata, caule recto, firmo, usque 1·5 m alto, basi fere 1·5 cm crasso, simplici, ex foliorum supremorum axillis interdum ramos laterales edente, racemose 4—9-cephalo, infra folioso, parce pilis albis, crispis, praedito, costis plurimis, pallidis, prominulis, obtusis, striato, supra nudo, densissime, breviter et molliter villosa, fere holosericeo, villis pallide fuscis, nitidulis, pellem deterilem formantibus vestito.*

Folia radicalia florendi tempore iam evanida, longe petiolata, ovata aut cordata, simplicia aut laciniis parvis utrimque singulis lyrata, margine remote denticulata, ca. 20 cm longa et 16 cm lata, petiolo 10—12 cm longo, supra plano, albido, glabro, subtus convexo, parce, crispule puberulo, basi dilatato, suffulta. *Folia caulina* tenuiter chartacea, scabrida, inferiora ca. 36 cm longa et 19 cm lata, breviter petiolata, lyrata, laciniis lateralibus 2—6, lineari-oblongis, ab infimis ad superiora sensim auctis, remote denticulatis, summis basi confluentibus, terminali maxima, ovata aut subcordata, acuta, sinuato-dentata. *Petioli* et *rhachis* supra planus, albidus, glaber, subtus parce crispule hirtellus, viridi-striatus. *Nervi laterales* in utraque facie prominuli, subparalleli pinnati, albidii. *Folia superiora* sensim diminuta, sessilia, obovato-oblonga, acuminata, alis cito attenuatis breviter decurrentia. *Folia summa* ad phylla squamiformia, coriacea, triangulari-lanceolata, acuta, extus densissime breviter subfusco-villosa, holosericea, pedunculos fulcrantia, reducta.

Capitula magna, pedunculis infimis usque 10 cm longis, erecto-patulis, densissime et breviter subfusco-villosis, holosericeis, superioribus cito abbreviatis, summis subnullis, suffulta.

Involucrum ovatum, basi truncatum, ca. 3 cm longum et aequilatum, densissime, breviter subfusco-villosum. *Phylla* omnia acuta, integerrima, exappendiculata neque mucronata, crasse coriacea, infima breviter triangulari-ovata, ca. 8 mm longa et 5 mm lata, intermedia ab externis late ovatis ca. 15 mm longis et 13 mm latis, adpressissimis, extus parte basali oblecta glabris, opacis, flavis, parte libera densissime breviter subfusco-villosis, holosericeis, sub tomento deteribili flavo-viridibus, substriatis, intus argenteis, glaberrimis, nitidissimis, apice acutis, induratis, subpungentibus, sed non mucronatis, ad interiora elongata et angustata, ovato-lanceolata et lanceolata, acuminata, apice indurata subpungentia, sed mucrone nullo distincto terminata, in margine anguste hyalina, maxima usque 25 mm longa et 12 mm lata, sensim aucta. *Phylla intima* abbreviata, anguste lanceolata, longe acuminata, acuta, mutica, tota fere

hyalina, alba, ca. 20 mm longa et 4 mm lata. Paleae setiformes, albae, ca. 15 mm longae.

Flosculi non radiantes, pallide flavi, lineis 5 purpureis ornati, usque 35 mm longi, tubus ca. 20 mm longus, limbus cylindricus in lobos lineares, obtusos, suberectos, antherarum tubum aequantes, ca. 4 mm longos, ad $\frac{1}{3}$ fissus, stylus ex antherarum tubo longe exsertus stigmatе tenuiter cylindrico, basi barbato. Filamenta dense et longiuscule papilloso-hirta.

Achaenia ca. 5 mm longa et 3 mm lata, subcompressa, eburnea, apice angustissime marginata. Pappi sordide flavi setae barbellatae, penultimae achaenio longiores, ca. 8 mm longae, fragiles, intimae albae, brevissimae, vix 1 mm longae.

Involucri phyllis omnino inermibus, integerrimis, exappendiculatis neque apice membranaceo-marginatis et indumento inflorescentiae et phyllorum holosericeo, pellim deterrentem formante, omnibus dispositionis Boissierianae sectionibus aliena et sectionem novam **Pelliceae** Nk. formans. Statura elata, capitulis magnis et inflorescentia racemosa species nonnullas sect. *Acrocentron* Boiss. ** *Cynaroidearum* Boiss. refert, quibus ceterum omnino aliena. Foliorum consistentia, et nervatura, capitulorum (ceterum multo maiorum) forma et phyllorum imbricatione et consistentia, et etiam achaenio albo et pappi setis barbellatis *Centauream Behen* L. refert, et sectionem **Pelliceae** in dispositione Boissieriana sectioni XI. *Microlophus* Boiss. proximam esse puto.

Habitat in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari in montis Maidanoke supra pagum Hašitha, dit. Ğulamerik, latere septentrionali, in humosis subhumidis alt. ca. 1600—1700 m. Legi 20. VI. 1910 (No. 3655).

Centaurea Bruguierana (DC.) Handel-Mazzetti: [= *Tetramorphaea Bruguierana* DC., *Centaurea phyllocephala* Boiss., cf. Handel-Mazzetti: *Pteridophyta* u. *Anthoph.* aus Mesopotamien... p. 451] Mesopotamia: in deserto inter Baḡdād et Bakūba, 30. IV. 1910 (No. 3697).

Centaurea solstitialis L. Mesopotamia: ad Mōsul, in silvula *Salicum* et *Populi Euphratici* in ripa Tigridis. 20. V. 1910 (No. 3701). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) ad septentriones ab oppido Mōsul, in agris sterilibus alt. ca. 350 m frequens. 6. VI. 1910 (No. 3710).

Centaurea Sinaica DC. var. nova **gossypina** Nábělek. *Caulibus et foliis dense et crispe albo-lanatis, lana in foliorum inferiorum axillis globulos opacos, densissimos, gossypinos, candidos formante. Pappi albi setis minute barbellatis, intermediis achaenio aequilongis.* Ceterum a specim. origin. differt foliis latioribus, non decurrentibus, sed inferioribus basi augustatis, superioribus minutissime auriculatis, qua nota cum specim. Kotschyani „in Palestina prope St. Saba (No. 661)“ lectis congruit.

Judaea: ad 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, alt. ca. -300 m. 26. V. 1909 (No. 3996).

Centaurea Iberica Trevir. In ruderatis ad pagos et in steppis frequens. Judaea: in ruderatis Hierosolymae alt. ca. 750 *m.* 2. VI. 1909 (No. 3687). Mesopotamia: Babylon (leg. Dr. Reuter, No. 3703). Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis ad pagum Matâra inter Salahije (Kifri) et Kerkuk, alt. ca. 350 *m.* 14. V. 1910 (No. 3671); ad pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môsul, in steppis alt. 500—700 *m* frequens. 27. VI. 1910 (No. 3688); in steppis inter Zacho (Azach) et Ğezîret-ibn-Ômar frequentissima.

Centaurea hyalolepis Boiss. (= *Centaurea pallescens* Del. var. *hyalolepis* Boiss.) Judaea: in ruderatis Hierosolymae, alt. ca. 750 *m.* 2. VI. 1909 (No. 3693). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Tuz Chormâti inter Salahije (Kifri) et Kerkuk, alt. ca. 300 *m.* 12. V. 1910 (No. 3702).

Chartolepis Tournefortii (L.) Jaub. et Sp. (= *Centaurea glastifolia* L.) Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in humosis subhumidis ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3686); ad pagum Baraspi in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in humosis alt. ca. 2500 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3662).

Zoegea Lept aurea L. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Ķasr-i-Širîn, in saxosis alt. ca. 800 *m.* 6. V. 1910 (No. 3659). In steppis humosis Kurdistaniae Turcicae meridionalis (Assyriae) et in Mesopotamia septentrionali (Ğebel et Tûr, Tûr Abdîn) frequentissima: ad Altun-Köpri inter Kerkuk et Erbil, alt. ca. 260—300 *m.*, 17. V. 1910 (No. 3657); ad pagum 'Ain Kawa prope Erbil (Arbela), in agris sterilibus et in steppa alt. ca. 380 *m.* 18. V. 1910 (No. 3658); ad pagum Maltai ad septentr. ab oppido Môsul, in steppis et in agris sterilibus alt. ca. 300—400 *m* frequentissima. 6. VI. 1910 (No. 3660). Ad oppidum Midiat (Ğebel et-Tûr), alt. ca. 1000 *m.* 10. VII. 1910 (No. 3656).

Crupina *crupinastrum* (Moris) Visian. Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), in lapidosis. 15. III. 1910 (No. 3818). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: colles inter pagos Baba Ğiğik et Kân-i-Watman dit. Erbil (Arbela)—Rewandûz, in steppa alt. ca. 700—900 *m.* 21. V. 1910 (No. 3820).

Aegialophila pumila (L.) Boiss. (= *Centaurea pumila* L.). Palaestina: in arenosis litoralibus ad oppidum Ĥaifa. 16. V. 1909 (No. 3971).

Cnicus benedictus L. Judaea: Tell Zacharia dit. Hierosolymae, in marginibus agrorum alt. ca. 450 *m.* 7. IV. 1909 (No. 3731). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: in agris sterilibus inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiğik dit. Erbil (Arbela)—Rewandûz, alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 3730).

Carthamus glaucus M. B. Moab et Arabia Petraea: frequens in vallibus profundis (Wâdi): Wâdi ez-Zerķa dit. Mâdaba (Moab), 28. VI. 1909 (No. 3717). Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis inter Môsul

et Tell-Kef -- Mâr Jakub alt. 300—500 *m* frequens. Ad pagum Mâr Jakub, 27. VI. 1910 (No. 3718).

Carthamus nitidus Boiss. Judaea: ad monasterium Mâr Sâba dit. Bethlehem, ad rupes alt. ca. 0 *m*. 25. V. 1909 (No. 3715). In vallibus (Wâdi) Moabiticis et Arabiae Petraeae non rarus.

Carthamus oxyacantha M. B. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis et agris sterilibus ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) ad septentr. ab oppido Môşul alt. ca. 400 *m*. 6. VI. 1910 (No. 3714).

Carthamus tinctorius L. Kurdistania Turcica: ad pagum Tell Mişâr ad orient. ab oppido S'ert cultus. 19. VII. 1910 (No. 3713).

Scolymus maculatus L. Kurdistania Turcica (Assyria): in steppis ad pagum Rewêni inter Zacho (Azach) et Ğezîret-ibn-Ômar, frequentissimus, alt. ca. 400 *m*. 2. VII. 1910 (No. 3981).

Catananche lutea L. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, alt. ca. 700 *m*. 26. III. 1909 (No. 3822); ad pagos Latrûn et Abu Rôş dit. Hierosolymae. 2. IV. 1909 (No. 3823 et 3824).

Cichorium pumilum Jacq. (= *Cichorium divaricatum* Schousb.). Mesopotamia: in ruinis Babylonis leg. Dr. Reuter (No. 3753). Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Naft ad oppidum Kerkuk, in steppa alt. ca. 400 *m*. 17. V. 1910 (No. 3752); ad pagum Taijân dit. Ğezîret-ibn-Ômar, in steppis et agris sterilibus alt. ca. 350 *m*. 2. VII. 1910 (No. 3754). Arabice „Abu erâbe“ id est „Digitorum pater“ vocatur (Dr. Reuter).

Hyoseris scabra L. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, 24. III. 1909 (No. 3861).

Hedypnois Cretica (L.) Willd. Judaea: 'Ain Fâra dit. Hierosolymorum, alt. ca. 350 *m*. 18. V. 1909 (No. 3863). Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 150 *m*. 2. V. 1910 (No. 3860). Kurdistania Persica: ad pagum Sar-i-Pul dit. Kâsr-i-Şîrîn, in graminosis humidis alt. ca. 500 *m*. 6. V. 1910 (No. 3859); Kurdistaniae Turcicae distr. Şerizor: Handrian-Dar supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), ad rivulum alt. ca. 1900 *m* (?), forma nana nimis juvenilis). 23. V. 1910 (No. 3803).

Lapsana peduncularis Boiss. forma pedunculis gracilibus recurvis. Kurdistania Persica: montes supra pagum Sar-i-Pûl dit. Kâsr-i-Şîrîn, alt. ca. 900 *m*. 4. V. 1910 (No. 3781). Forma typica: Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 *m*. 23. VIII. 1910 (No. 3780).

Koelpinia linearis Pall. Persia australis: ad pagum 'Ali Ğengi dit. Buşîr (Abu Şehr), in arenosis. 15. II. 1910 (No. 3857, f. nana). Persia austro-occidentalis (Susiana): in desertis et steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 3852 et 3856, forma elata); Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem, ad terram nudam argilosam, 27. III. 1910 (No. 3855,

f. nana.). Mesopotamia: in deserto ad ruinas Babylonis, 18. IV. 1910 (No. 3853, f. nana).

Rhagadiolus stellatus DC. α hebelaenus Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, ad terram nudam, ad vias et in margine agrorum frequens alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 3858). Persia austro-occidentalis (Susiana): in ruinis Susorum ad terram nudam, plantae nanae nimis iuvenes. 16. III. 1910 (No. 3804).

Garhadiolus Hedypnois (F. et M.) Jaub. et Sp. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Kaunak (Kônak) inter Šuštar et Dizfûl, in deserto ad terram nudam sub frutice Zizyphi nummulariae (plantae minutissimae). 12. III. 1910 (No. 4001); Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), inter lapides. 25. III. 1910 (No. 3862). Kurdistania Persica: inter Hanikîn et Kâsr-i-Šîrîn, in declivitatibus meridiem spectantibus aridissimis alt. ca. 350 m. 3. V. 1910 (No. 3990); Kâsr-i-Šîrîn, in ruinis castelli ad terram nudam alt. ca. 400 m. 3. V. 1910 (No. 3991).

Thrinicia tuberosa (L.) DC. Judaea: ad pagum Abu Rôš dit. Hierosolymorum, alt. ca. 450 m. 2. IV. 1909 (No. 3776). Gallilaea: Šafed, in collibus basalticis alt. ca. 850 m. 24. IV. 1909 (No. 3777). Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in vineis alt. ca. 700 m. 12. X. 1909 (No. 3778).

Leontodon hispidulum (Del.) Boiss. var. *tenuiloba* Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): frequens in desertis et in steppis in desertum transeuntibus inter oppida Šuštar et Dizfûl, circa ruinas Susorum et inde usque ad Deilerûn (Deh-i-Loran). Variat foliorum laciniis interdum in eadem planta triangularibus, triangulari-lanceolatis et longe et angustissime linearibus. Secundum stationem aridam aut subhumidam (in alveolis) differt scapis monocephalis 5—7 cm altis et scapis 2—5-cephalis usque 35 cm altis. Ad pagum Kaunak (Kônak) inter Šuštar et Dizfûl, 11. III. 1910 (No. 3960); ad ruinas Susorum, 16. III. 1910 (No. 3961); in planitie inter fluv. Ćekâb et Tib, 24. III. 1910 (No. 3962); ad fluv. Dwerič (Duweirīč), 24. III. 1910 (No. 3963); ad Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 3959).

Leontodon Danubialis Jacq.¹ Kurdistania Turcicae distr. Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, ad nives tabescentes alt. ca. 2550 m. 28. VII. 1910 (No. 3779).

Leontodon asperum (W. K.) Poir var. *Huetii* Boiss. Kurdistania Turcicae distr. Ramorân: mons Halakur-Daṛ ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in pascuis alpinis alt. ca. 2400 m. 26. VII. 1910 (No. 3938). Taurus Armenus: Warak-Daṛ prope Wan, ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2300 m. 23. VIII. 1910 (No. 3996).

Leontodon asperrium (Willd.) Boiss. Kurdistania Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradên dit. Amadia, in quercetis alt. ca. 1200 m.

¹ Det. cl. Dr. Handel-Mazzetti.

16. VI. 1910 (No. 3993); ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašitha, in quercetis alt. ca. 1100 m. 16. VII. 1910 (No. 3940). Armenia Turcica in agris ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell. (No. 3941.)

Picris strigosa M. B. Taurus Armenus: traiectus de Gurundašt inter Šattak et Wan, in latere meridionali alt. ca. 1700 m. Cimices valde olet. 31. VII. 1910 (No. 3957). Kurdistaniae Turcae distr. Hakkari: in valle torrentis Âv Kočânes infra pagum Kočânes dit. Ğulamerik, alt. ca. 1400 m. 5. IX. 1910 (No. 4012).

Picris Sprengeriana (L.) Lam. Gallilaeae: 'Ain Tabra et 'Ain Tine ad Tiberiadem, in rupibus alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 3951 et 3952).

Picris Babylonica Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotamien... p. 453] Ğebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, in deserto alt. ca. 120 m. 2. V. 1910 (No. 3998).

Picris desertorum Nábëlek spec. nova. (Tab. XI, fig. 2, pag. 6, fig. 4.) Sect. *Eupicris* Boiss. *Annua, radice verticali, tenui, fibras laterales teneras edente. Caulis unicus, plerumque a basi divaricatum pauciramosus, ramis monocephalis, humilis, 5—8 cm longus, basi dense, sursum parce foliatus, tenuiter pluristriatus, cum foliis et involucri phyllis pilis patentibus, glochidiatis, sordide flavidis et praeterea pilis albis, crispulis, hirtus. Folia radicalia lanceolata, 2—3 cm longa, 3—4 mm lata, acuta, runcinato-lobata, lobis acutiusculis, integris, basi longe attenuata; media diminuta, subintegra, basi subauriculata sessilia; suprema minuta, anguste lanceolato-lineararia, acuta, integra. Pedunculi tenues, floriferi et mox post anthesin non incrassati.*

Capitula erecta, mediocria, ovata, non constricta, diametro 1.5—2 cm tenentia. Involucri phylla exteriora pauca, linearilanceolata, adpressa, dorso dense albido-tomentella et glochidiata, interiorum longitudinis $\frac{1}{2}$ aut $\frac{1}{3}$ attingentia. Phylla interiora ca. 8—10 mm longa, lanceolato-lineararia, acutissima, herbacea, margine angustissime albido-scariosa, ad lineam medianam albido-tomentella et glochidiata, a basi ca. ad medium carinata, sursum planiuscula. Flores intense lutei, anthesi incipiente subaurantiaci, involucrium ca. 5—6 mm superantes, ligulis anguste linearibus, acute 5-dentatis. Achaenia omnia conformia, submatura flavo-brunnea, exteriora subincurva, cylindrica, basi attenuata, apice in rostrum achaenii longitudinis ca. dimidiam partem attingens, tenuissimum, squamuloso-asperum, sensim abeuntia, subtiliter 5-sulcata. ubique tenuiter transverse rugosa, glaberrima, cum rostro 4—5 mm longa. Pappus caducus, ca. 4 mm longus, albus, basi sordide flavidus, setis interioribus 10—12 basi dilatatis, sursum longiuscule plumosis, exterioribus 6—8 brevibus setaceis, formatus.

Ex affinitate *Picridis Babylonicae* Hand.-Mzt. esse videtur, a qua caulibus et pedunculis gracilioribus, foliis angustioribus, involucri

phyllis angustissime nec late marginatis, rostro tenui nec crasso, pappi setis basi dilatatis differt.

Habitat in desertis et steppis in deserta transeuntibus in Persia austro-occidentali (Susiana), inter fluvios Dweriĉ (Duweiriĉ) et Ćekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), ubi sat frequens. Legi 24. III. 1910 (No. 3995 et 4010).

Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -250 *m.* 30. III. 1909 (No. 3954). Persia austro-occidentalis (Susiana): in ripa fluv. Šaûr prope ruinas Susorum, 15. III. 1910 (No. 3782); Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i Loran), 25. III. 1910 (No. 3955).

Geropogon glabrum L. Palaestina: Tell-el Mutesselim (Megiddo) in planitie Esdreton dit. Ĝenîn, in palude. 6. V. 1909 (No. 3828). Persia austro-occidentalis (Susiana): in planitie inter fluvios Šaûr et Kercha, in graminosis humidis. 22. III. 1910 (No. 3833). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 1500 *m.* 5. V. 1910 (No. 3830a).

Tragopogon longirostre Bisch. Mesopotamiâ: Chân Abu-Ĝisr inter Bardâd et Bakûba, ad fossam irrigationis. 1. V. 1910 (No. 3834). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Širîn, in graminosis alt. ca. 1500 *m.* 5. V. 1910 (No. 3830).

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. latifolium Boiss. Palaestina orientalis (Haurân): ad pagum El-Hösn, in agris alt. ca. 670 *m.* 19. IV. 1909 (No. 3827). Taurus Armenus: mons Harefta supra pagum Baraspi, inter pagos Baškala et Koĉânes, alt. ca. 2100 *m.* 1. IX. 1910 (No. 3832).

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. stenophyllum Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter. Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tib. 27. III. 1910 (No. 3829).

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. inter var. latifolium Boiss. et var. stenophyllum intermedium. Taurus Armenus: traiectus de Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris ad pagum Gurundašt alt. ca. 2000 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 3743); Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in graminosis alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3831).

Tragopogon reticulatum Boiss. et Huet (?), achaenia desunt; caules simplices, monocephali, 7—9 *cm* alti, aut capitulo terminali depasto ramos breves laterales monocephalos edentes). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ĝelo-Dar dit. Ĝulamerik, in pascuis alpinis ad tentoria aestiva Djezra, alt. ca. 2800 *m.* 3. IX. 1910 (No. 3746).

Scorzonera laciniata L. α genuina Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradên dit. Amadia in valle Sapna, inter frutices Quercorum alt. ca. 900 *m.* 14. VI. 1910 (No. 3745); distr. Hakkiari:

mons Siares supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in graminosis alt. ca. 1700 m. 17. VI. 1910 (No. 3936).

Scorzonera mollis M. B. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis alt. ca. 1000—1200 m. 23. V. 1910 (No. 3738 et 3742).

Scorzonera mollis M. B. var. *longifolia* Boiss. [Flosculi pallide lutei, extus violaceo-suffusi.] Kurdistania Turcica: montes ad pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, in graminosis alt. 1500—1700 m. 5. V. 1910 (No. 3741 et 3830).

Scorzonera picridioides Boiss. Heliotropii odorem edens. Radix inferne tuberosa. Persia australis: ad pagum Hawîze dit. Bušîr (Abu Šehr) in radicibus montium Kuh Chormûğ, ad terram nudam., 20. II. 1910 (No. 3732).

Scorzonera papposa DC. Judaea: Jericho, ad terram nudam, alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 3733). Persia austro-occidentalis (Susiana): Kuh Beijât (Ĝebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem, ad terram nudam sabulosam. 27. III. 1910 (No. 3735). Mesopotamia: Ĝebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 180 m. 2. V. 1910 (No. 3736); Ĝebel Kumataš (Ĝ. Hamrîn) ad pagum Kezrabad inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 m. 3. V. 1910 (No. 3734). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašîtha, inter frutices quercuum alt. ca. 1300 m. 16. VI. 1910 (No. 3739).

Scorzonera elata Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: in valle fluvii Zab prope pagum Kočânes dit. Gulamerik, in lapidosis siccis alt. ca. 1400 m. 5. IX. 1910 (No. 3747).

Scorzonera rigida Auch. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, inter rupes alt. ca. 2700—2800 m. 31. VIII. 1910 (No. 3737 et 4011).

Scorzonera intricata Boiss. var. nova **Petraea** Nk. (Tab. XI, fig. 1. et Tab. XII., fig. 2.) Differt a speciminibus orig. Aucherianis (in herbario Palat. mus. Vindobon.) et a specim. a cl. Bornmüller ad Kerman, in regione alpina Kuh-i-Nasr alt. 3800 m collectis *caulibus longioribus (usque 35 cm altis) et tenuioribus, minus ramosis, ramis erecto-patulis aut suberectis, minus copiosis et (junioribus) non aut vix incrassatis, pedunculis longioribus, gracilioribus, persistentibus sed vix incrassatis*. Ceterum indumento, capitulorum magnitudine et forma achaenii, pappo etc. plantae a me in Arabia Petraea collectae cum plantis Persicis congruunt. A *Scorzonera tortuosissima* Boiss. habitu dissimillima, cuius pedunculi frutiferi non sunt incrassati, differt achaenii cum pappo ca. 2 cm nec ca. 3 cm (13—14 lineas) longis. Legi in Arabia Petraea in ruinis Petrae (Wâdi Mûsa), ad Ed-Dêr, ubi ad rupes arenaceas suffruticulos subglobosos ca. 1/2 m altos format. 19. VI. 1909 (No. 3942).

Scorzonera veratrifolia Fenzl. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: in valle Hawaspi in montibus Ğelo, inter rupes calcar. nigras alt. 1600—1700 *m.* 6. IX. 1910 (No. 3983).

Scorzonera nervosa Trevir. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: mons Bestabîje prope pagum Hoz inter pagos Haşîtha et Ğulamerik, in herbidis ad solum humosum alt. ca. 1600 *m.* 30. VII. 1910 (No. 3994).

Taraxacum¹ *microcephalum* Pom. Armenia Turcica: Traiectus supra pagum Ćabachĉur inter Muş et Charput, ad fontem alt. ca. 1850 *m.* 30. IX. 1910 (No. 3774). Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3755).

Taraxacum microcephalum Pom. vel potius *Taraxacum* primigenium Hand.-Mzt., quod sine achaeniis non discernitur (Handel-Mazzetti). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Haşîtha et Şattak, in alveolis nivalibus alt. ca. 2600 *m.* 28. VII. 1910 (No. 3769).

Taraxacum megalorrhizon (Forsk.) Hand.-Mzt. Arabia Petraea: Wâdi Buseira inter Şôbak et Elĝi (Petra), ad fontem 'Ain es-Sa'we. 17. VI. 1909 (No. 3765). Mesopotamia: ad pagum Meskene ad Euphraten, [introducendum?, nam in areali T. Wallichii! Handel-Mazzetti]. 3. XII. 1909 (No. 3762). Syria: Aintab, in castello alt. ca. 950 *m.* 20. X. 1910 (No. 3766).

Taraxacum monochlamydaeum Hand.-Mzt. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter Dizful et ruinas Susorum, in locis subhumidis. 14. III. 1910 (No. 3768). Mesopotamia: Babylon (determinatum specimen incompleti incerta.) Leg. Dr. Reuter (No. 3767).

Taraxacum pseudonigricans Hand.-Mzt. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn, ad rivulum alt. ca. 1800 *m.* 5. V. 1910 (No. 3773).

Taraxacum Stevenii (Sprg.) DC. p. p. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, ad nives tabescentes alt. ca. 2500 *m.* 26. VII. 1910 (No. 3761); distr. Hakkari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Haşîtha et Şattak, ad nives alt. ca. 2600 *m.* 28. VII. 1910 (No. 3775).

Taraxacum kurdicum Hand.-Mzt., nomen novum. [Syn.: *Taraxacum paradoxum* Hand.-Mzt. in Ann. Naturhist. Hofmus. Wien XXVII, p. 457 (1913) et in Oesterr. Bot. Zeitschrift LXXII, p. 261 (1923), non Palmgren in Acta soc. fauna et fl. Fennica, XXXIV, Nr. 1, p. 41 (1910).] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in alveolis nivalibus et in pascuis alpinis alt. 2700—2900 *m.* 3. IX. 1910 (No. 3760).

¹ Taraxaci spec. omnium revisionem exsecutus est et species plures determinavit cl. Dr. H. Handel-Mazzetti.

Taraxum vulgare (Lam.) Schrk. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Dwile supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, inter muscos ad fontem alt. ca. 1700 *m.* 18. VI. 1910 (No. 3763).

Taraxacum fontanum Hand.-Mzt. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: traiectus ad Aradên inter pagos Amadia et Hašitha, ad fontem in latere septentr. alt. ca. 1450 *m.* 15. VI. 1910 (No. 3757). Districtus Hakkiari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz, inter Pagos Hašitha et Šattak, ad nives tabescentes alt. ca. 2600 *m.* 28. VII. 1910 (No. 3770); mons Dwile supra pagum Hašitha, alt. ca. 1650 *m.* 18. VI. 1910 (No. 3764, determ. incerta).

Taraxacum stenolepium Hand.-Mzt. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Širîn, ad nives tabescentes alt. ca. 2000 *m.* 5. V. 1910 (No. 3772). Armenia Turcica: Wan, in pratis humidis infra castellum, alt. ca. 1700 *m.* 19. VIII. 1910 (No. 3771).

Taraxacum syriacum Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: mons Bestabiĵe prope pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in humosis alt. ca. 1600 *m.* 30. VII. 1910 (No. 3756); distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra alt. ca. 2100 *m.* 2. IX. 1910 (No. 3758).

Taraxacum montanum (C. A. Mey.) DC. Taurus Armenus (Kurdistaniae Turc. distr. Hakkiari): in valle fluv. Bochtan inter pagos Chômar et Šattak, in lapidosis alt. ca. 1400 *m.* 31. VII. 1910 (No. 3759).

Chondrilla juncea L. Kurdistania Turcica: in glarea rivuli inter pagos Tell Kef et Maltai ad septentr. ab oppido Môşul, alt. ca. 300 *m.* 6. VI. 1910 (No. 3835).

Chondrilla juncea L. var. *acantholepis* Boiss. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, ad rivum alt. ca. 1900 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3844).

Sonchus asper Vill. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Ķîr) dit. Šuštâr, ad limum in ripis fluv. Âb-i-Šoteit et Âb-i-Girgir frequens. 8. III. 1910 (No. 3783).

Sonchus tenerrimus L. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis et desertis ad ruinas Susorum, praesertim inter frutices Prosopidis Stephanianae frequens. 16. III. 1910 (No. 3532). Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter.

Sonchus maritimus L. Arabia Petraea: ad rivos in vallibus profundis. Wâdi el Hsâ alt. ca. 300 *m.* 16. VI. 1909 (No. 3950); ad oppidum Ma'ân. In litore Maris Mortui ad Mezra'a in peninsula El-Lisân, alt. 390 *m.* 14. VI. 1909 (No. 3949). Persia austro-occidentalis (Susiana), ad ruinas Susorum, in paludibus et ad aquas. 15. III. 1910 (No. 3784):

Sonchus palustris L. Taurus Armenus: mons Harefta, inter pagos Baškala et Kočânes, ad rivum alt. ca. 1900 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3785).

Mulgedium *Tataricum* L. Armenia Turcica: ad pagum Chôšab dit. Wan, in agris alt. ca. 1850 *m.* 7. IX. 1910 (No. 3850).

Lactuca *tuberosa* L. fil. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub ad septentr. ab oppido Môşul, in steppa alt. ca. 700 *m.* 10. VI. 1910 (No. 3740); districtus Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Haşîtha, in quercetis alt. ca. 1200 *m.* 16. VI. 1910 (No. 3739).

Lactuca *Scariola* L. var. *integrifolia* Bisch. [= *Lactuca dubia* Jord.] Judaea: ad pagum El-Kubebe dit. Hierosolymorum, alt. ca. 700 *m.* 26. VII. 1909 (No. 3841).

Lactuca *aculeata* Boiss. et Ky. *Foliorum lamina verticalis. Caulis albus infra valide aculeatus, paniculae rami nudî nitidi.* Plantae saepe 2 *m* superantes. Mesopotamia superior: Ğebel-et-Tûr (Tûr Abdîn), in agris ad oppidum Midiat, alt. ca. 1000 *m.* 10. VII. 1910 (No. 3836).

Lactuca *saligna* L. Arabia Petraea: Seil el-Hsâ inter El-Kerak et Et-Tafile, alt. ca. 350 *m.* 17. VI. 1909 (No. 3838). Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3842).

Lactuca *scarioloides* Boiss. Taurus Armenus: traiectus de Gurundaşt inter Şattak et Wan, in humosis subhumidis lateris meridionalis alt. ca. 1850 *m.* 31. VII. 1910 (No. 3837); montes inter fluv. Howaraş et Şerkônes dit. Başkala-Koşânes, alt. ca. 2100 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3840).

Lactuca *Orientalis* Boiss. Taurus Armenus: Topra Kaleh prope Wan, in marginibus agrorum alt. ca. 1900 *m.* 17. VIII. 1910 (No. 3845); traiectus de Çuk inter Chôšab et Başkala, inter rupes alt. ca. 2200 *m.* 8. IX. 1910 (No. 3846). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: in valle fluv. Zab prope pagum Koçânes dit. Ğulamerik et in valle rîvi Âv Koçânes eiusdem ditionis in lapidosis alt. ca. 1400—1450 *m.* 1. IX. 1910 (No. 3839) [No. 3845 et 3846 forma **gracilis** *ramosissima, ramis tenuibus, humilibus, divaricatissimis et intricatis*; No. 3839 forma **robusta** *caulibus strictis firmis basi tantum ramosis, ramis erectis subcirgatis*.]

Lactuca *triquetra* (Labill.) Boiss. Syria: ad rupes supra pagum Antelias prope Beirût. 17. XI. 1910 (No. 3843).

Lactuca *microcephala* DC. [= *Cephalorrhynchus hispidus* (M. B.) Boiss.] *Flosculi pallide albido-lutei.* Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Şîrîn, in humosis subhumidis alt. ca. 1200 *m.* 5. V. 1910 (No. 3847). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: mons Siars supra pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in humosis alt. ca. 1800 *m.* 19. VI. 1910 (No. 3851); mons Maidanoke supra Haşîtha, alt. ca. 1900 *m.* 20. VI. 1910 (No. 3848).

Launaea (*Zollikoferia*) *mucronata* (Forsk.) Muschl. Persia austro-occidentalis (Susiana): convallis Cherr-e-Nemek in monticulis Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerân (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem. 27. III. 1910 (No. 3849 et 3943).

Launaea (*Zollikoferia*) *fallax* (Jaub. et Sp.) Muschl. Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân. 21. VI. 1909 (No. 3935).

Mesopotamia: ad limum sabulosum inter Museijib et Kerbela. 14. IV. 1910 (No. 3934).

Picridium Tingitanum (L.) Desf. var. minus Boiss. Judaea: Jericho, ad terram nudam aridissimam alt. ca. -300 *m* 19. III. 1910 (No. 4007).

Picridium dichotomum (M. B.) Fisch. et Mey. Kurdistaniae Turicae distr. Hakkari: in valle torrentis Âv Koçânes infra pagum Koçânes dit. Ğulamerik, in humosis alt. ca. 1400 *m*. 5. IX. 1910 (No. 3948).

Crepis Sahendi Boiss. et Buhse. (Specimina mea cum specim. Buhseanis e monte Ssahend in herbario Mus. palat. Vindobonensi congruentia, sed uti haec nimis invenilia, florere incipientia). Kurdistaniae Turicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2450 *m*. 26. VII. 1910 (No. 3937).

Crepis Sieberi Boiss. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosoly-ma, alt. ca. 650 *m*. 25. III. 1909 (No. 3999).

Crepis rhoeadifolia M.B. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter fluv. Ćekâb et Tib. inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran). 24. III. 1910 (No. 3997). Mesopotamia: Môşul, in silvula Salicum et Populi Euphratici in ripa Tigridis (forma *elata*, fere 1.5 *m* alta, pedunculis elongatis, post anthesin sursum subincrassatis, capitulis subminoribus, involucris angustioribus apice subconstrictis, flosculis exterioribus extus rubellis). 30. V. 1910 (No. 3956). Taurus Armenus: supra pagum Şattak ad meridiem ab urbe Wan, in humosis subhumidis alt. ca. 1650 *m*. (Forma caulibus basi simplicibus a medio aut supra medium ramosissimis subcorymbosis, ramis angulo recto divaricatis, sursum arcuatis.) 31. VII. 1910 (No. 3958).

Crepis Marschallii (C. A. Mey.) Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), ad fluv. Ćekâb 24. III. 1910 (No. 3947).

Crepis alpina L. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şirîn, alt. ca. 800 *m*. 6. V. 1910 (No. 3993). Kurdistaniae Turicae distr. Şerizor: Handrian-Dar supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela). in graminosis alt. ca. 900 *m*. 23. V. 1910 (No. 3992).

Crepis aspera L. Judaea: Jericho, in horto, alt. ca. -300 *m*. 19. III. 1909 (No. 3946). Moab: Wâdi Mōĝib (Arnon) inter Mâdaba et El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 300 *m*. 25. VI. 1909 (No. 3945). Arabia Petraea: Wâdi el-Hsâ, ad rivum alt. ca. 350 *m*. 16. VI. 1909 (No. 3944).

Hieracium echioides Lumn. Kurdistaniae Turicae distr. Hakkari: vallis de Gabenerik inter pagos Haşitha et Amadia, alt. ca. 1350 *m*. 22. VI. 1910 (No. 3966). Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in graminosis alt. ca. 2200 *m*. 23. VII. 1910 (No. 3965).

Hieracium procerum Fries. Taurus Armenus: mons Harefta supra pagum Baraspi inter pagos Baškala et Kočânes, in graminosis alt. ca. 2200 m. 1. IX. 1910 (No. 3964).

Hieracium umbellatum L. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, alt. ca. 2200 m. 23. VII. 1910 (No. 3967).

Lagoseris sancta (L.) Maly (= *Lagoseris bifida* [Vis.] Boiss.) Judaea: Jericho, ad terram nudam, alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 4004). Palaestina Orientalis: ad pagum Ammân (Rabbath Ammon), in steppis alt. ca. 800 m. 17. IV. 1909 (No. 4005).

Lagoseris Marschalliana (Rehb.) Hand.-Mzt. (= *Lagoseris orientalis* Boiss., cf. Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotamien p. 456). Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis inter ruinas Susorum et Deilerân (Deh-i-Loran). 22. et 24. III. 1910 (No. 4008 et 4009).

Lagoseris Marschalliana (Rehb.) Hand.-Mzt. var. nova **leptocaulis** m. (Tab. XI, fig. 3.) *Folia radicalia ambitu oblongo-lanceolata vel oblonga, in petiolum brevem attenuata, remote, grosse dentata aut runcinata aut runcinato-pinnatifida, lobis anguste lineari-lanceolatis, acutis, nervo unico subtus prominulo, albido, percursa, facie superiore fere glabra, inferiore praesertim ad nervum et in margine pilis glanduliferis, albis, parce obsita, 3—4 cm longa.*

Scapi singuli aut pauci, erecti, tenues, 8—11 cm longi, basi crebrius pilis glanduliferis, albidis, patulis, asperi, sursum glabri, inferne simplices, supra medium subdichotome ramosi, ramis plerumque 3, aut 2—5, monocephalis, fere filiformibus, ad ramificationes bracteam squamiformem, lineari-setaceam, gerentes.

Capitula parva, ante anthesin nutantia, florentia erecta, ca. 1.5 cm diametro tenentia. Involucrum ante anthesin cylindricum, tum obconicum. Phylla externa breviter triangulari-ovata, acuta, albo-marginata, 1—1.5 mm longa, glaberrima; phylla interna anguste linearia, acuta, dorso atro-viridia, albo-marginata, obtuse carinata, glaberrima, ca. 6 mm longa. Flosculi 9—10 mm longi, ligula pallide lutea, apice truncata, acutiuscule 5-dentata. Pappi setae albae, tenuissimae, florendi tempore involucri breviores. Achaenia desiderata.

A formis typicis differt praesertim omnium partium gracilitate, capitulis fere triplo minoribus, scapis superne et involucri phyllis glabris, phyllis exterioribus minimis, foliis radicalibus saepe runcinato-pinnatifidis. Formae diminutae scapis et phyllis plus minus piloso-glandulosis vel subglabris, foliis indivisis, ex Persia austro-occidentale (Kerman, leg. Bornmüller No. 4142 et 4143) ex Persia occidentali (Sultanabad, leg. Th. Strauss) et de Hamadan: in monte Elwend (leg. Th. Strauss) transitum praebere videntur.

Habitat in Persia austro-occidentali (Susiana) ad pagum Kaunak (Kônak) inter oppida Šuštar et Dizfûl, in deserto sub fruticibus Zizyphi nummulariae. Legi 12. III. 1910 (No. 4002).

Correctio: Bupleuri speciem novam, in huius enumerationis parte I., pag. 120 descriptam et nomine „aristatum“ iam praeoccupato (*Bupleurum aristatum* Bartl in Reichenbach Ic. Fl. Germ.) praeditum, cl. J. Rohlenae Pragensi, florum Balcanicae doctissimo, dedico et **Bupleurum Rohlenae** Nábělek voco.

Index generum.

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Achillea 12 | Cynara 34 | Mulgedium 54 |
| Aegialophila 46 | Dipterocome 27 | Notobasis 34 |
| Amberboa 38 | Echinops 27 | Onopordon 35 |
| Anthemis 14 | Eclipta 11 | Pallenis 4 |
| Arctium 30 | Erigeron 3 | Phaeopappus 37 |
| Aster 3 | Eupatorium 3 | Phagnolon 8 |
| Asteriscus 4 | Evax 11 | Picridium 55 |
| Atractylis 30 | Filago 11 | Picris 49 |
| Bellis 4 | Garhadiolus 48 | Pulicaria 7 |
| Bidens 12 | Geropogon 50 | (Pyrethrum) 19 |
| Calendula 26 | Gnaphalium 9 | Rhagadiolus 48 |
| Carduus 33 | Gundelia 27 | Rhaponticum 37 |
| Carlina 30 | Gymnarrhena 10 | Scolymus 47 |
| Carthamus 46 | Hedynois 47 | Scorzonera 50 |
| Catananche 47 | Helichrysum 9 | Senecio 25 |
| Centaurea 38 | Hieracium 55 | Serratula 36 |
| (Chamaemelum) 17 | Hyoseris 47 | Siebera 30 |
| Chardinia 29 | Inula 5 | Silybum 34 |
| Chartolepis 46 | Iphiona 7 | Sonchus 53 |
| Chondrilla 53 | Jurinea 36 | Sphaeranthus 7 |
| Chrysanthemum 19 | Koelpinia 47 | Taraxacum 52 |
| Chrysophthalmum 4 | Lachnophyllum 4 | Thrinicia 48 |
| Cichorium 47 | Lactuca 54 | Tragopogon 50 |
| Cirsium 33 | Lagoseris 56 | Triptaris 26 |
| Cnicus 46 | Lapsana 47 | Urospermum 50 |
| Codonocephalum 4 | Launaea 54 | Xanthium 12 |
| Conyza 7 | Leontodon 48 | Xeranthemum 29 |
| Cousinia 30 | Leyssera 10 | Zoegea 46 |
| Crepis 55 | Matricaria 17 | (Zollikoferia) 54 |
| Crupina 46 | Micropus 11 | |
-

Tab. I.



1. *Chrysanthemum Heimerlei* Nk. — 2. *Inula Hakkiarica* Nk. — 3. *Conyza Varthemiodes* Nk. — 4. *Helichrysum pseudoplicatum* Nk. — 4a. Capitulum.

Tab. II.



Achillea Nábělekii Heimerl.



1. *Anthemis Susiana* Nk. — 2. *Anthemis rigida* Nk. — 3. *Matricaria melanophylla* Nk.



Chrysanthemum Zahlbruckneri Nk.



1. *Chrysanthemum Kotschyi* (Boiss.) Nk. var. *griseum* Nk. a) f. *grandiflora*, b) f. *parviflora*. — 2. *Chrysanthemum balsamitoides* Nk.



1. *Onopordon candidum* Nk. — 1a, capitulum. — 2. *Echinops bicolor* Nk.



1. *Centaurea glaphyrocephala* Nk. — 2. *Phacopappus Aucheri* (DC.) Boiss. var. *Szovitzii* Boiss. f. *dissecta* m.



Centaurea Chaldaeorum Nk.





Centaurea schizophylla Nk.



Centaurea Némecii Nk.



1. *Scorzonera intricata* Boiss. var. *Petraea* Nk. — 2. *Picris desertorum* Nk. —
3. *Lagoseris Marschalliana* (Rchb.) Hand.-Mzt. var. *leptocaulis* Nk.



1



2




3

4



5



1. *Echinops viscosus* DC. — 2. *Scorzonera intricata* Boiss. var. *Petraea* Nk., *Retama Roetam* (Forsk.) Webb., *Juniperus Phoenicea* L. — 3. *Centaurea Iberica* Trev. — 4. *Cousinia stenocephala* Boiss., *Pimpinella Kotschyana* Boiss., *Centaurea schizophylla* Nk. — 5. *Cynara Kurdica* Hand.-Mzt.

51. J. SAHÁNEK: Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektro-
nových lampách. (An Explanation of the Origin of short electro-
magnetic Waves in Valves.)
52. FR. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars II: Plantarum collectarum
enumeratio (Compositae).

Seznam sešitů 1—50 zašle na požádání Přírodovědecká fakulta
(Brno, Kounicova 63).

Pour le catalogue des fascicules 1—50 s'adresser à la Faculté des Sciences
(Brno, Kounicova 63).